

resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2014



LESSINIA = MAGIA



Parco Naturale Regionale della Lessinia



© Copyright 2017 Parco Naturale Regionale della Lessinia - Comunità Montana della Lessinia
Associazione Verona Birdwatching

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura di), 2017: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia.
Anno 2014. Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching, pp. 32.

In copertina: re di quaglie a Campofontana, di Paolo Parricelli.

In quarta di copertina: quaglia ad Azzarino, di Paolo Parricelli.



resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2014

a cura di

Maurizio Sighele
Paolo Parricelli





Presentazione

L'avifauna selvatica rappresenta uno degli elementi più evidenti e caratteristici del ricco e variegato patrimonio faunistico del Parco della Lessinia. La cospicua varietà di specie, determinata da una notevole diversità di ambienti e paesaggi naturali, contribuisce a fare dell'Area Protetta un sito di eminente importanza naturalistica e conservazionistica.

Come le scorse edizioni, anche questo nono "Resoconto Ornitologico del Parco della Lessinia" si propone quale utile strumento di divulgazione, senz'altro capace di far conoscere e apprezzare ai frequentatori del Parco lo straordinario e suggestivo mondo degli uccelli.

Un doveroso e sincero ringraziamento all'Associazione Verona Birdwatching e a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione con grande competenza, intensa passione e gratuito impegno.

Stefano Sisto

*Commissario Straordinario Comunità Montana della Lessinia
Parco Naturale Regionale della Lessinia*



Introduzione

In questo nono resoconto sono annotate le segnalazioni più significative attinenti all'avifauna selvatica incontrata nel 2014 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia e nelle aree limitrofe. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza per la nidificazione, lo svernamento, gli erratismi, la curiosità o l'interesse locale. Sono stati raccolti e analizzati alcune migliaia di dati riferiti a 146 specie diverse.

Tra le segnalazioni più interessanti rilevate nel corso del 2014 si ricordano: lo svernamento di 73 individui di zigolo delle nevi, il più alto numero mai registrato in Lessinia; l'accertata riproduzione di gufo reale; gli interessanti rilevamenti di tuffetto, re di quaglie, pavoncella, piviere tortolino, gabbiano reale, civetta nana, gruccione, grillai, monachella e ortolano; le osservazioni di airone bianco maggiore, albanella pallida, gallinella d'acqua, gambecchio comune, ghiandaia marina e migliarino di palude, specie mai segnalate nei precedenti resoconti, che portano il numero complessivo dei *taxa* a 181. Alquanto singolare, infine, l'avvistamento di un tetraone mezzano nel limitrofo territorio trentino, un ibrido di gallo cedrone e fagiano di monte. La tassonomia segue le indicazioni di BRICHETTI & FRACASSO (2015).

La gran parte delle segnalazioni proviene dalla rete dell'associazione Verona Birdwatching. Ulteriori informazioni sono state raccolte dal personale del Servizio Guardaparco, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, dai Corpi di Polizia Provinciale di Verona e Vicenza e di Veneto Agricoltura durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio. Alcune segnalazioni sono pervenute anche da appassionati, escursionisti, fotonaturalisti e residenti. Tutte le immagini di questo resoconto sono state riprese in Lessinia nel corso del 2014.

Hanno contribuito alla stesura di questa pubblicazione: *Davide Aldi, Mick Allen, Maurizio Azzolini, Anna Bandieri, Claudio Bandieri, Marco Banterla, Stefania Barugola, Domenico Benciolini, Alessandro Berardo, Sergio Bergamini, Domenico Bernasconi, Paolo Bertini, Tommaso Borghetti, Paolo Boschi, Michele Bottazzo, Maurizio Busato, Pierangelo Canali, Chiara Castagna, Ernesto Cavallini, Carla Chiappisi, Maurizio Cordioli, Valentina Corradi, Alessandra Corso, Micaela Cristofaletti, Francesco Dal Dosso, Piero Dal Dosso, Marianna Dalla Riva, Giangaetano Dalle Vedove, Michele Dall'O, Mauro D'offria, Elena Facchini, Vittorio Fanelli, Riccardo Farnea; Raffaele Favatà, Alessandro Franzoi, Giacomo Gaudenzi, Nicola Grandi, Enza Grippo, Alessio Gualdo, Claudio Isotta, Cristiano Izzo, Augusto Laghi, Roberto Lerco, Gianbattista Leso, Manuel Leso, Francesco Lezzi, Maurizio Lezzi, Luca Mazzola, Paolo Panarotto, Carmela Pastura, Paolo Parricelli, Fabio Pegoraro, Gianluca Perlato, Daniele Peterlini, Marco Peterlini, Antonio Petronio, Eugenio Pighi, Anna Pigozzo, Giulio Piras, Giorgio Rigo, Sergio Rima, Max Samaritani, Andrea Saorin, Ugo Sauro, Luigi Sebastiani, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Luca Signori, Dorino Stocchero, Paola Tarasco, Ernesto Toffali, Fulvio Valbusa, Roberta Vignola, Corrado Zanini, Mario Zara.*

Le osservazioni più interessanti del 2014

Germano reale

Anas platyrhynchos

Anatra segnalata nel Parco quasi esclusivamente nel periodo post-riproduttivo.

5 indd. nei pressi del Bivio del Pidocchio il 15.08 (M. Busato).

Alzavola

Anas crecca

È l'anatra europea di dimensioni più piccole, avvistata in Lessinia perlopiù nel transito migratorio autunnale.

4 indd. a Malga Costeggioli il 4.09 (P. Parricelli);

2 indd. nei pressi di San Giorgio il 5.09 (C. Izzo, M. Allen);

1 ind. a Cima Lobbia il 17.09 (F. Pegoraro);

18 indd. nei pressi di Castelberto il 28.09 (C. Izzo);

1 cp. nei pressi di Malga Lessinia il 2.12 (A. Laghi).

Francolino di monte

Tetrastes bonasia

Il più piccolo dei tre tetraonidi presenti nel Parco, caratterizzato da un piumaggio altamente mimetico; poco comune, segnalato quasi esclusivamente nella Foresta di Giazza e nelle aree boscate limitrofe a Castelberto.

2 mm. nel Corno d'Aquilino il 3.07 e 1 f. il 4.07 (C. Isotta);

1 ind. tra Rifugio Revolto e Lago Secco il 12.11 (P. Parricelli).

Gallo cedrone

Tetrao urogallus

Specie rara e localizzata, strettamente legata a vasti e maturi complessi forestali; segnalata esclusivamente nella Foresta di Giazza, nella Foresta dei Folignani, a Le Gosse e nel limitrofo territorio trentino tra Sega di Ala e Castelberto.

1 m. ripetutamente avvistato e ripreso con fototrappola a Le Gosse tra aprile e maggio (P. Parricelli, L. Signori, C. Castagna, V. Corradi *et al.*);

1 m. nei pressi di Zoneche di Bosco Chiesanuova il 2.05 (M. Leso);

1 f. nei pressi di Passo Scagina di Crespadoro (VI) il 17.09 (F. Pegoraro *et al.*);

1 m. a Le Gosse il 9.12 (P. Parricelli).

Fagiano di monte

Lyrurus tetrix

Tetraonide presente quasi esclusivamente nel settore nord-orientale del Parco. Nei censimenti primaverili nelle aree di canto, tra il 15.04 e il 25.05, sono stati conteggiati 22 indd. (16 mm. e 6 ff.), così ripartiti:

Valon: 8 mm. e 1 f. il 15.04, 4 mm. e 1 f. il 6.05, 8 mm. il 25.05 (P. Parricelli, L. Signori, P. Canali, A. Saorin *et al.*);

alta Val Fraselle: 4 mm. e 3 ff. il 20.05 (P. Parricelli, L. Signori, P. Boschi);

Passo Zevola: 1 m. e 1 f. il 20.05 (M. Bottazzo);

Molesse-Passo Lora: 3 mm. e 1 f. il 20.05 (P. Dal Dosso).

Nei censimenti tardo estivi per il rilevamento del successo riproduttivo eseguiti il 17.09 e il 20.09 sono stati conteggiati 35 indd. così ripartiti:

Valon – Trappola - Bella Lasta il 17.09 e il 20.09: 3 ff. con covata e 11 juvv., 3 ff. senza covata, 4 mm. (P. Parricelli, F. Valbusa, D. Benciolini, A. Saorin, C. Castagna *et al.*);

Foresta Demaniale Regionale di Giazza (Passo Lora - Zevola Molesse - Alta Val Fraselle - Gramolon - Lobbia) il 17.09: 1 f. con 1 juv., 8 ff. senza covata, 3 mm., 1 ind. (D. Stocchero, F. Pegoraro, A. Gualdo *et al.*).

Inoltre:

2 mm. in rugolio nel Valon il 2.11 (G. Leso).

Tetraone mezzano

Lyrurus tetrix x Tetrao urogallus

Prima segnalazione nota in Lessinia e aree trentine limitrofe di questo ibrido tra fagiano di monte e gallo cedrone.

1 m. nei pressi di Malga Campobrun, Ala (TN), il 16.11 (M. Bottazzo).

Coturnice

Alectoris graeca

Fasianide alquanto raro e localizzato, solitamente contattato lungo il versante destro della Val di Revolto e i limitrofi alti pascoli.

1 ind. sul Monte Grolla il 12 e il 24.05 e poi ancora 4 indd. l'11.07 (P. Parricelli).

Tuffetto

Tachybaptus ruficollis

Seconda segnalazione in Lessinia di questo piccolo svasso, avvistato nella stessa pozza d'alpeggio dove era già stato rilevato nel 2013.

1 ind. ai Parpari il 15.09 (C. Izzo, M. Allen).

Airone guardabuoi

Bubulcus ibis

Ancora una segnalazione di questo ardeide nei pendii della Lessinia, la prima risale al 2011 (SIGHELE & PARRICELLI, 2012-2014).

3 indd. sul Monte Tregnago il 26.11 (C. Isotta).



Coturnice sul Monte Grolla - Paolo Parricelli

Airone cenerino***Ardea cinerea***

Negli ultimi anni alcuni esemplari sono costantemente segnalati sugli alti pascoli, in prossimità delle pozze d'alpeggio e lungo i rari corsi d'acqua presenti; si riportano solo le segnalazioni più interessanti:

- 1 ind. nel Vajo della Marciora il 12.03 (E. Cavallini);
- 1 ind. ai Folignani di Fondo il 28.03 (L. Signori);
- 1 ind. a Lonico di Cerro V.se il 30.09 (U. Sauro);
- 1 ind. a Molin del Cao, Valle dei Progni, il 28.11 (P. Parricelli).

Airone bianco maggiore***Ardea alba***

Prima segnalazione per questo ardeide di cui non si ha alcuna altra notizia per la zona della Lessinia.

- 1 ind. in volo sopra il Monte Solane il 21.11 (V. Fanelli, E. Grippo).

Cormorano***Phalacrocorax carbo***

Specie coloniale tipica degli ambienti acquatici; sorvola regolarmente l'altipiano durante il transito migratorio, prevalentemente nel mese di marzo.

- 10 indd. in volo sopra Castelberto il 16.03 (L. Mazzola);
- 30 indd. sopra Podestaria il 28.03 (P. Parricelli);
- 9 indd. in volo sopra il Corno d'Aquilio il 28.09 (V. Fanelli, E. Grippo).

Falco pecchiaiolo ***Pernis apivorus***

Rapace migratore di lungo raggio che sverna in Africa sub-sahariana; nel Parco varie coppie si riproducono prevalentemente nelle aree boscate situate alle quote meno elevate. Nel 2014 è stato osservato tra il 10.05 e il 7.09 (R. Lercio *et al.*).

Biancone***Circaetus gallicus***

Aquila migratrice specializzata nella predazione di rettili; nidifica pressoché regolarmente in Lessinia e anche nel 2014, tra l'11.04 e il 5.09, è stato ripetutamente segnalato nell'intera area degli alti pascoli e in Val Fraselle. Gli avvistamenti più frequenti sono avvenuti nelle zone di San Giorgio e Malere in agosto e Cava Bellocca tra aprile e luglio.

Aquila reale***Aquila chrysaetos***

È stata nuovamente accertata la riproduzione della coppia territoriale nota nell'area della Foresta Demaniale Regionale di Giazza, con



Biancone - Daniele & Marco Peterlini



pullo di pochi giorni rilevato nel nido il 20.05 (P. Parricelli, C. Castagna), di 1 juv. involato da poco in Val di Revolto il 27.08 (M. Cordioli, S. Barugola) e successivi ripetuti avvistamenti in zona dei 2 add. e del juv. sino a settembre inoltrato (P. Parricelli, L. Signori, G. Perlato *et al.*). Di seguito si elencano gli avvistamenti più interessanti o inusuali:

- 1 ind. a Branchetto il 27.04 mobbato da un nibbio bruno e da un lodolaio (C. Isotta);
- 1 ind. al Pigarolo il 25.05 che trasportava una marmotta, probabilmente verso il nido (M. Samaritani);
- 1 indd. a Cava Bellocca, Tregnago, il 6.07 (G. Dalle Vedove *et al.*);
- 1 subad. a Bocchetta della Vallina il 14.09 mobbato da corvi imperiali e da poiana (V. Fanelli, E. Grippo);
- 3 indd. ai Costeggioli il 22.12 (P. Parricelli).

Astore

Accipiter gentilis

Rapace schivo e solitario, molto simile al più comune sparviere, ma molto più robusto; predilige complessi boscati maturi, prevalentemente di conifere pure o miste a latifoglie, ricchi di radure.

- 1 ind. a San Francesco l'8.02 (M. Sighele, R. Vignola, M. Allen);
- 1 ind. a Griez il 9.02 (G. Rigo);
- 1 ind. nel Vajo dell'Anguilla il 9.03 (C. Izzo, M. Allen);
- 1 ind. a Boar di Cerna il 23.04 (M. D'offria);
- 1 ind. a Camposilvano il 4.05 (C. Izzo);
- 1 ind. a San Giorgio il 17.08 (R. Farnea);
- 1 ind. a Bocca di Selva il 24.08 (M. Sighele);
- 1 ind. a sud di Castagnè il 2.09 (E. & M. Cavallini, M. Dall'O);
- 1-2 indd. al Ponte dell'Anguillara il 15.09 e l'1.11 (C. Izzo, M. Allen);
- 1 ind. a Malga Faggioli il 15.09 (C. Izzo, M. Allen);
- 1 ind. a Scandole il 15.10 (E. Cavallini);
- 1 ind. al Pigarolo il 2.11 (R. Lerco).

Falco di palude***Circus aeruginosus***

Rapace diurno strettamente legato alle zone umide che negli ultimi anni è regolarmente segnalato in Lessinia durante i periodi migratori, perlopiù in settembre nel corso del passo post-riproduttivo.

1-2 indd. sul Monte Loffa il 6.04 (gruppo Verona BW);

1 ind. ai Parpari l'1.05 (C. Isotta);

7-8 indd. in volo di migrazione tra Castelberto e Podestaria il 5.09 (M. Sighele, G. Sighele, R. Vignola, C. Izzo, M. Allen);

1 ind. a Bocchetta della Vallina il 18.09 (P. Parricelli).

Albanella reale***Circus cyaneus***

Nei nove anni di resoconti ornitologici è l'unica specie di *Circus* regolarmente segnalata nel Parco, quasi esclusivamente durante il transito migratorio.

1 f. ai Parpari tra il 19 e il 27.04 (G. Perlato, E. Toffali, P. Tarasco *et al.*);

1 m. a Malga Lessinia il 7.09 (R. Lerco);

1 m. in alta Val Squaranto il 21.11 (M. D'offria);

1 m. sul Monte Solane il 23.11 (V. Fanelli, E. Grippo).

Albanella pallida***Circus macrourus***

Prima segnalazione in Lessinia di questa specie assai sporadica in provincia di Verona, osservata molto di rado durante i passi migratori.

1 m. a Castelberto l'8.09 (G. Perlato).

Nibbio bruno***Milvus migrans***

Questo rapace migratore si riproduce regolarmente in Lessinia, perlopiù nelle aree boscate della Val d'Adige. Nel 2014 è stato osservato tra il 29.03 e il 31.08 (M. Allen *et al.*).



Albanella pallida a Castelberto - Gianluca Perlato

Gallinella d'acqua***Gallinula chloropus***

Prima segnalazione nota in Lessinia di questa specie assai comune nelle zone paludose e nei corsi d'acqua di tutta la pianura veronese.

1 cp. nidificante in uno stagno artificiale a Casale di Sotto di Grezzana (C. Isotta), presente anche nel 2013.

Re di quaglie***Crex crex***

Specie estiva molto scarsa e localizzata in Lessinia; difficile da avvistare poiché si mantiene nascosta tra la vegetazione e risulta quindi contattabile solo grazie al suo inconfondibile canto.

1-3 mm. in canto a Sengio Rosso di Velo V.se il 6.6, ripetutamente contattati sino a fine giugno (P. Parricelli);

3-6 mm. cantori nei pressi di Campofontana tra il 30.06 e il 19.07 (F. Pegoraro, P. Parricelli, L. Signori, M. Sighele, M. Allen, R. Lercò, R. Favatà *et al.*).

Pavoncella***Vanellus vanellus***

Specie relativamente comune nelle aree planiziali della provincia, mentre in Lessinia è avvistata di rado, specialmente in periodo invernale.

2 indd. a Costeggioli di Sopra il 23.11 (T. Borghetti).

Piviere tortolino***Charadrius morinellus***

Limicolo particolarmente confidente avvistato spesso durante la migrazione post-riproduttiva, soprattutto sugli alti pascoli della porzione centrale del Parco.

1-4 indd. tra Podestaria e Castelberto tra l'1 e il 7.09 (P. Parricelli, C. Castagna, F. Valbusa, gruppo Verona BW);

1 ind. a Castelberto il 5.10 (L. Mazzola).

Piviere tortolino a Castelberto - Roberto Lercò



Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Limicolo osservato prevalentemente durante la migrazione post-riproduttiva, più di rado in primavera.

2 indd. ai Parpari il 29.04 (C. Isotta).

Gambecchio comune *Calidris minuta*

Prima segnalazione in Lessinia di questo limicolo tipico della tundra.

1 ind. in sosta in una pozza tra Podestaria e il bivio per Castelberto il 7.09 (gruppo Verona BW).

Gabbiano reale *Larus michahellis*

Seconda segnalazione di questo gabbiano in Lessinia dopo quella del 2012 (SIGHELE & PARRICELLI, 2013), la prima all'interno del Parco.

8 indd. in volo sopra Scandole il 9.03 (C. Izzo, M. Allen).

Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*

Specie di presenza recente, segnalata in alcuni centri abitati e aree limitrofe sino ai 750 m di quota circa. Oltre a diversi indd. tra Lugo e Cerro V.se, si ricorda:

3 indd. a Lughezzano il 12.03 (E. Cavallini).

Assiolo *Otus scops*

Rapace notturno migratore poco comune in Lessinia; abbastanza elusivo, si individua soprattutto per il caratteristico richiamo territoriale monotono e cadenzato.

2 indd. a Castelberto l'1.08 (L. Mazzola);

1 ind. a Fosse il 16.08 (A. Petronio).

Gufo reale *Bubo bubo*

Anche nel 2014 è stata rilevata la nidificazione di questo affascinante strigide raro e localizzato in Lessinia.

1 ad. in cova il 16.03 e 2 pulli il 9.05 nel sito di nidificazione in alta Valpantena (M. Sighele, G. Sighele, R. Lerco, C. Izzo, C. Zanini *et al.*).

1 ind. a Le Gosse il 25.10 (F. Dal Dosso).



Civetta nana***Glaucidium passerinum***

Il più piccolo dei rapaci notturni europei; in Lessinia è raro e localizzato, contattato esclusivamente nella porzione centro-orientale del Parco.

1 ind. a Castelberto il 22.12 (P. Parricelli).

Civetta capogrosso***Aegolius funereus***

Rapace notturno sedentario e molto localizzato, la Lessinia rappresenta il margine più meridionale dell'areale riproduttivo di questa specie nell'arco alpino centro-orientale.

1 ind. in canto ai Folignani il 2.04 (P. Parricelli);

1 ind. in canto a Malga Terrazzo il 12.05 (P. Parricelli).

Gufo comune***Asio otus***

Strigide particolarmente elusivo, in Lessinia certamente assai più comune e diffuso rispetto a quanto paiono attestare i dati annualmente raccolti.

1 ind. a S. Giorgio il 13.08 (P. Parricelli);

1 ind. a Spiazzoi il 13.09 (G. Perlato);

1 ind. a Buso del Valon il 20.09 (P. Parricelli).

Ghiandaia marina***Coracias garrulus***

Le poche segnalazioni in Lessinia di questa colorata specie risalgono agli anni 90 del XX secolo, oltre a qualche segnalazione nelle zone collinari tra la Valpolicella e la Valdadige. Questa è quindi la prima segnalazione ricordata in questi resoconti:

1-2 indd. a Canello e Trezzolano, Verona, il 15 e il 18.08 (C. Izzo, E. Cavallini, N. Grandi, R. Lerco *et al.*).



Ghiandaia marina - Cristiano Izzo



Grillaio a Canello - Maurizio Sighele

Gruccione

Merops apiaster

Anche nel 2014, per il quarto anno consecutivo, si sono ripetute le osservazioni di singoli esemplari e raggruppamenti, talora anche cospicui, perlopiù in periodo di transito migratorio post-riproduttivo (SIGHELE & PARRICELLI, 2012-2014).

100-120 indd. a Praole nella prima decade di agosto (C. Isotta).

Upupa

Upupa epops

Specie inconfondibile, regolarmente osservata in Lessinia durante i passi migratori, scarsa invece come nidificante; si riportano pertanto i dati raccolti durante il periodo riproduttivo:

2 indd. tra Crenzi e Masetto avvistati per diverse settimane a partire dal 13.04 (P. Parricelli);

1 ind. con imbeccata nei pressi di Vallene l'1.06 (V. Fanelli);

1 ind. a Bosco Chiesanuova il 5.06 (P. Parricelli).

Torcicollo

Jynx torquilla

Picidae migratore presente nel Parco con regolarità durante i passi migratori, più raro nel periodo riproduttivo:

1 ind. a San Vitale, Roverè V.se, il 7.06 (R. Lerco).

Picchio nero

Dryocopus martius

Picchio inconfondibile e abbastanza vocifero, strettamente legato alle fustaie mature di conifere e latifoglie. Le segnalazioni degli ultimi anni paiono attestare l'espansione della popolazione storicamente nota nella Foresta di Giazza e nei Folignani, Si elencano quindi solo le osservazioni rilevate all'infuori di tali siti.

1 ind. a Rocca Pia il 9.03 (A. Corso);

1 ind. a Boar di Cerna tra aprile e maggio (M. D'offria);

1 ind. a Squaranto di Roverè Veronese, ripetutamente udito e avvistato in tutto il periodo riproduttivo (P. Parricelli).

Grillaio *Falco naumanni*

Specie di problematica identificazione per l'elevata somiglianza con l'assai più comune gheppio. Raro in provincia di Verona, anche grazie a un monitoraggio finalizzato alla ricerca di questa specie nel 2014 è stato nuovamente osservato in Lessinia nello stesso sito di sosta utilizzato nel biennio precedente durante la migrazione post-riproduttiva (LERCO & SIGHELE, 2016).

1-6 indd. a Canello, Verona, tra il 9 e il 31.08 (R. Lercò, C. Izzo, M. Allen, D. Bernasconi, V. Fanelli *et al.*).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Specie gregaria osservata in Lessinia perlopiù nel corso del transito migratorio primaverile.

1 ind. tra Dosso Alto e i Parpari il 29.04, quindi 3-4 indd. il 9 e il 10.05 (C. Isotta, C. Izzo, M. D'offria, G. Perlatto);

1 ind. a Canello, Verona, tra il 17 e il 21.08 (C. Izzo, M. Allen, D. Bernasconi, A. Pigozzo, E. Cavallini *et al.*).

Smeriglio *Falco columbarius*

Falco migratore che in Italia è presente come svernante o nei periodi dei passi migratori, come capita più frequentemente in Lessinia.

1 ind. a Erbezzo il 7.02 (L. Mazzola);

1 ind. ai Parpari il 24.05 (M. D'offria).

Lodolaio *Falco subbuteo*

Falco di dimensioni medio-piccole segnalato in Lessinia a partire dal 2007, sia in periodo riproduttivo sia nei passi migratori (SIGHELE & PARRICELLI, 2008-2014). Nel 2014 è stato osservato tra il 24.04 e il 5.09, ricordiamo solo:

1 ind. sul Monte Loffa il 22.06 (V. Fanelli *et al.*);

1 ind. a Campofontana il 6.07 (M. Sighele, M. Allen);

1 ind. a Collina, Badia Calavena, l'11.07 (P. Panarotto).



Falco pellegrino***Falco peregrinus***

Falcone abbastanza comune in Lessinia, dove ha iniziato a nidificare con l'istituzione del Parco; negli ultimi decenni si è registrato un marcato incremento della popolazione con espansione delle aree stabilmente occupate.

Averla maggiore***Lanius excubitor***

Rara ma regolare visitatrice invernale, spesso con marcata fedeltà ad alcuni siti di svernamento.

- 1 ind. nei pressi di Fagioli, Erbezzo, il 15.02 (A. Franzoi);
- 1 ind. sul Monte Loffa il 16.11 e l'8.12 (V. Fanelli, E. Grippo, G. Dalle Vedove);
- 1 ind. a Gaspari, Erbezzo, il 9.12 (C. Isotta).

Rigogolo***Oriolus oriolus***

Specie poco comune in Lessinia, elusiva e diffidente, spesso è contattata unicamente per il richiamo flautato che emette il maschio. Si ricorda una segnalazione in periodo riproduttivo:

- 1 ind. nei pressi di Tezze, Velo V.se, l'1.06 (G. Piras).

Gazza***Pica pica***

Specie poco comune di recente insediamento in Lessinia; presente perlopiù nei fondovalle e sui rilievi situati alle quote meno elevate (SIGHELE & PARRICELLI, 2007, 2011, 2012, 2014).

- 2 indd. a Boar di Cerna tra il 9.04 e il 18.08 (M. D'offria *et al.*);
- 1 ind. tra il Monte Loffa e Fosse il 18.05 e il 2.06 (V. Fanelli, M. Sighele);
- 1-2 indd. a Vallene tra settembre e ottobre (P. Parricelli *et al.*).

Taccola***Corvus monedula***

Questo corvide di abitudini gregarie e sociali di recente è stato osservato nei fondovalle e nei rilievi a bassa quota della Lessinia (SIGHELE & PARRICELLI, 2014).

- 1 ind. sul Monte Tregnago il 10.10 (C. Isotta).

Cornacchia nera***Corvus corone***

Corvide abbastanza raro in Lessinia, talora può formare coppie miste con la più comune cornacchia grigia.

- 2 indd. a Cavagile il 6.01 (M. Sighele);
- 1 ind. a Erbezzo l'8.03 (C. Izzo, M. Allen);
- 1 ind. a Villanova di Erbezzo l'11.03 (P. Parricelli);
- 1 ind. a San Giorgio il 19.07 (R. Lerco);
- 1 ind. a Malga Lessinia il 22.08 e in seguito il 22.10 (D. Bernasconi, P. Parricelli);
- 1 ind. a Molina il 2.11 (C. Zanini, M. Dalla Riva);
- 1 ind. a Piazzolli, Selva di Progno, il 4.11 (P. Parricelli, L. Signori);
- 1 ind. a Colper, Velo V.se, il 4.11 (P. Parricelli);
- 3 indd. ad Azzarino il 20.11 (C. Isotta);



1 ind. a Dere di Roverè V.se il 10.12 (C. Isotta);
1 ind. ai Parpari il 13.12 (G. Gaudenzi).

Sterpazzola

Sylvia communis

Silvide estivo segnalato sugli alti pascoli del Parco a partire dal 2009 (SIGHELE & PARRICELLI, 2010-2014). Le osservazioni del 2014 si riferiscono perlopiù al Valon del Malera, dove è stata frequentemente segnalata tra il 3.05 e il 14.08 (C. Izzo, P. Parricelli, M. Sighele *et al.*). Osservata anche a Campofontana in luglio (G. Dalle Vedove *et al.*).

Picchio muraiolo

Tichodroma muraria

Specie variopinta tipica delle zone rupestri di alta quota, con caratteristico lungo becco sottile e arcuato. In Lessinia è rara e localizzata, avvistata prevalentemente nei mesi invernali.

1 ind. a Castelberto l'11.01 (L. Mazzola);
1 ind. alla Torre del Falasco almeno tra il 21.01 e il 28.03 (M. D'offria, G. Perlato, N. Grandi, R. Lerco *et al.*);
1 ind. a Passo Mesole - Catarin (VI) tra il 7 e il 14.10 (BOSA, 2016);
1 ind. alla Torre del Falasco il 25.10 e ancora il 25.12 (R. Lerco, P. Bertini, C. Izzo);
2 ind. a Pigarolo alla fine di ottobre (G. Leso);
1 ind. a Passo Pertica (TN) il 12.12 (G. Perlato).

Merlo dal collare

Turdus torquatus

Turdide migratore abbastanza comune come nidificante nel settore nord-orientale del Parco. Nel 2014 è stato segnalato nel Valon, a Castelberto e ai Parpari tra il 6.05 e il 7.09 (E. Cavallini, C. Izzo, G. Dalle Vedove, M. Sighele *et al.*).



Codirossone

Monticola saxatilis

Specie rara e localizzata, regolarmente osservata in alta Lessinia tra i mesi di aprile e settembre. Si ricordano:

almeno 2 cpp. a Branchetto tra il 18.04 e il 25.08, adulti con imbeccata dalla fine di giugno (P. Parricelli, D. Bernasconi, M. Sighele, R. Vignola, C. Bandieri *et al.*);

almeno 2 cpp. a San Giorgio, con prime osservazioni a partire dal 25.04, giovani nella prima metà di agosto, presenza di qualche individuo almeno fino al 10.09 (G. Perlato, M. Lezzi, C. Bandieri, S. Rima, M. Banterla, M. Allen *et al.*); osservato anche 1 m. marcato con anello metallico tra luglio e settembre (C. Izzo, L. Sebastiani, G. Perlato *et al.*): era stato inanellato da pullo sul Gran Sasso (AQ) nel luglio 2011 (archivio ISPRA);

1 cp. sul Monte Grolla il 12.05 (P. Parricelli);

1 ind. a Malga Gaibana il 28.05 (P. Parricelli);

1 ind. verso il Pigarolo il 10.08 (D. Aldi).

Monachella

Oenanthe hispanica

Specie piuttosto sporadica in provincia di Verona soprattutto sui rilievi; nel 2014 è stata nuovamente segnalata in Lessinia occidentale nello stesso sito dove era già stata rilevata nel 2013.

1 m. del morfismo a gola nera a Molane il 7.05 (C. Isotta);

1 m. del morfismo a gola nera (e forse anche 1 f.) a Fosse tra il 9.05 e il 20.07 (P. Parricelli, M. Sighele, G. Sighele, M. Lezzi, V. Fanelli *et al.*).

Merlo acquaiolo

Cinclus cinclus

Specie strettamente legata ai corsi d'acqua montani, compie erratismi invernali verso quote inferiori. In Lessinia è localizzato lungo i pochi torrenti presenti nella Valle dei Progni, Vajo della Marciora, alta Val d'Alpone e nel comprensorio della Foresta Demaniale Regionale di Giazza, dove, anche nel 2014, è stato ripetutamente avvistato soprattutto tra maggio e luglio.

Sordone

Prunella collaris

Visitatore invernale poco numeroso e localizzato in Lessinia, con individui che compiono brevi erratismi dai limitrofi massicci montuosi. È possibile che qualche coppia si riproduca negli habitat idonei nella porzione più settentrionale del Parco (DE FRANCESCHI, 1991).

1 ind. a Castelberto l'1 e il 30.01 (A. Corso, L. Mazzola);

4-8 indd. a San Giorgio tra il 29.01 e il 15.02 (E. Cavallini, M. Sighele, M. Allen, R. Vignola, V. Fanelli, E. Grippo *et al.*).

L'inverno successivo:

4-5 indd. a Pigarolo il 30.10 (C. Isotta);

6 indd. a Malga Bagorno il 21.11 (M. D'offria);

6-7 indd. a San Giorgio il 9.12 (C. Isotta).

Fringuello alpino

Montifringilla nivalis

Come la precedente specie, anche questo passeriforme, nidificante nei limitrofi massicci montuosi, è rilevato nel Parco esclusivamente nei mesi invernali.

40 indd. a Malga Malera il 3.01 (M. Cordioli, S. Barugola);

15-50 indd. a Bocca di Selva tra il 5.01 e il 20.02 (M. Azzolini, E. Cavallini, R. Lerco, M. Sighele, M. Allen, V. Fanelli *et al.*);

4 indd. a Malga Lessinia l'11.01 (L. Mazzola);

2 indd. nei pressi di Camposilvano il 29.01 (E. Cavallini);

6-15 indd. a San Giorgio tra il 9 e il 16.02 (G. Dalle Vedove, V. Fanelli, E. Grippo).

L'inverno successivo:

15 indd. sul Monte Tomba il 9.11 (P. Parricelli, F. Valbusa).





Fringuello***Fringilla coelebs***

Passeriforme comune e diffuso in Lessinia, si ricorda un conteggio durante una ricerca triennale promossa da Veneto Agricoltura nella catena delle Tre Croci:

56.780 indd. a Passo Mesole - Catarin (VI) in 11 giornate di monitoraggio tra il 3.10 e il 7.11; analogamente nelle stesse località l'anno precedente erano stati contati 46.378 indd. tra l'1.10 e il 5.11.2013 (BOSA, 2016).

Peppola***Fringilla montifringilla***

Fringillide presente in Lessinia solamente fra ottobre e marzo, cioè nei periodi di diello svernamento e dei passi migratori. Si ricorda pertanto una segnalazione in periodo inusuale:

1 ind. sul Monte Loffa il 6.04 (M. Lezzi, F. Lezzi *et al.*).

Frosone***Coccothraustes coccothraustes***

Singolare fringillide caratterizzato da forme massicce e becco particolarmente robusto; in Lessinia è frequente soprattutto durante il passo post-riproduttivo e in inverno. Nel 2014 è stato segnalato in marzo e in seguito da ottobre a dicembre:

alcuni indd. a Scandole l'8.03 (C. Izzo, C. Chiappisi, M. Allen);

3.442 indd. a Passo Mesole - Catarin (VI) in 11 giornate di monitoraggio tra il 3.10 e il 7.11 (BOSA, 2016).

1 ind. a Selva di Progno il 31.10 (G. Perlato);

1 ind. al Pigarolo il 2.11 (R. Lerco);

1 ind. a Cancellò il 3.11 (C. Izzo, M. Allen);

1 ind. a Dere di Roverè V.se il 10.12 (C. Isotta);

2 indd. a San Francesco di Roverè V.se il 24.12 (C. Isotta);

alcuni indd. alla Torre del Falasco il 26.12 (P. Bertini, C. Izzo);

1 ind. a Bosco Chiesanuova il 30.12 (E. Cavallini).

Crociere***Loxia curvirostra***

Fringillide solitamente gregario strettamente legato ai boschi di conifere delle valli alpine e prealpine; in Lessinia è poco numeroso, ma è osservato con regolarità, perlopiù in autunno inoltrato e in inverno. Si riportano gli avvistamenti dei raggruppamenti più consistenti:

100 indd. ca. in alta Val di Revolto il 16.01 (P. Parricelli);

30 indd. a Bosco Chiesanuova in ottobre e novembre (P. Parricelli).

Ortolano***Emberiza hortulana***

Di presenza esclusivamente estiva, è uno zigolo abbastanza scarso in provincia di Verona. In Lessinia nel 2014 è stato segnalato nel mese di maggio nella zona di Cava Belloca, Tregnago.



Zigoli delle nevi a Bocca di Selva - *Roberto Lerco*

Migliarino di palude

Emberiza schoeniclus

Prima segnalazione in Lessinia di questo zigolo tipico delle zone umide, osservato durante la migrazione post-riproduttiva.

1 ind. a Passo Mesole - Catarin (VI) il 3.10 (BOSA, 2016).

Zigolo delle nevi

Plectrophenax nivalis

Si conferma regolare lo svernamento in Lessinia di questa specie a distribuzione circumartica, con il raggiungimento dei massimi storici di consistenza numerica nel Parco nell'inverno 2013/2014.

4-30 indd. a Bocca di Selva alla fine del 2013, in seguito gruppo più numeroso con 50-70 indd. osservati in gennaio e febbraio e con il conteggio massimo mai registrato in questi anni di 73 indd. il 24.02; successivamente segnalazioni di un minor numero di individui fino al 28.03 (P. Parricelli, M. Samaritani, M. Cordioli, S. Barugola, V. Fanelli, M. Lezzi *et al.*);

osservazioni di 3-7 indd. sono state effettuate anche a San Giorgio, a Dosso Alto e al Passo delle Fittanze tra metà febbraio e marzo (A. Franzoi, C. Pastura, L. Mazzola *et al.*).

L'inverno successivo:

12 indd. a Costeggioli l'11.12 (P. Parricelli).



Calandro - Maurizio Sighele

Specie segnalate in Lessinia nel 2014

Anseriformes

Anatidae

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Alzavola *Anas crecca*

Galliformes

Phasianidae

Francolino di monte *Tetrastes bonasia*

Gallo cedrone *Tetrao urogallus*

Fagiano di monte *Lyrurus tetrix*

Coturnice *Alectoris graeca*

Sterna *Perdix perdix*

Quaglia *Coturnix coturnix*

Fagiano comune *Phasianus colchicus*

Podicipediformes

Podicipedidae

Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*

Pelcaniformes

Ardeidae

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Airone cenerino *Ardea cinerea*

Airone bianco maggiore *Ardea alba*

Suliformes

Phalacrocoracidae

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Accipitriformes

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Biancone *Circaetus gallicus*

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Sparviere *Accipiter nisus*

Astore *Accipiter gentilis*

Falco di palude *Circus aeruginosus*

Albanella reale *Circus cyaneus*

Albanella pallida *Circus macrourus*

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Poiana *Buteo buteo*

Gruiformes

Rallidae

Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*

Charadriiformes

Charadriidae

Pavoncella *Vanellus vanellus*

Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

Scolopacidae

Beccaccia *Scolopax rusticola*

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Gambecchio comune *Calidris minuta*

Laridae

Gabbiano reale *Larus michahellis*

Columbiformes

Columbidae

Piccione di città *Columba livia* f. domestica

Colombaccio *Columba palumbus*

Tortora selvatica *Streptopelia turtur*

Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculo *Cuculus canorus*

Strigiformes

Strigidae

Assiolo *Otus scops*

Gufo reale *Bubo bubo*

Allocco *Strix aluco*

Civetta nana *Glaucidium passerinum*

Civetta *Athene noctua*

Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

Gufo comune *Asio otus*

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

Apodiformes

Apodidae

Rondone maggiore *Tachymarptis melba*

Rondone comune *Apus apus*

Coraciiformes

Coraciidae

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

Meropidae

Gruccione *Merops apiaster*

Bucerotiformes

Upupidae

Upupa *Upupa epops*

Piciformes

Picidae

Torcicollo *Jynx torquilla*

Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*

Picchio nero *Dryocopus martius*

Picchio verde *Picus viridis*



Picchio verde - *Valentina Corradi*

Falconiformes

Falconidae

Grillaio *Falco naumanni*
Gheppio *Falco tinnunculus*
Falco cuculo *Falco vespertinus*
Smeriglio *Falco columbarius*
Lodolaio *Falco subbuteo*
Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Passeriformes

Laniidae

Averla piccola *Lanius collurio*
Averla maggiore *Lanius excubitor*

Oriolidae

Rigogolo *Oriolus oriolus*

Corvidae

Ghiandaia *Garrulus glandarius*
Gazza *Pica pica*
Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*
Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*
Taccola *Corvus monedula*
Cornacchia nera *Corvus corone*
Cornacchia grigia *Corvus cornix*
Corvo imperiale *Corvus corax*

Paridae

Cincia mora *Pariparus ater*
Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*
Cincia bigia *Poecile palustris*
Cincia alpestre *Poecile montanus*
Cinciarella *Cyanistes caeruleus*
Cinciallegra *Parus major*

Alaudidae

Tottavilla *Lullula arborea*
Allodola *Alauda arvensis*

Hirundinidae

Rondine *Hirundo rustica*
Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*
Balestruccio *Delichon urbicum*

Aegithalidae

Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Phylloscopidae

Lù grosso *Phylloscopus trochilus*
Lù piccolo *Phylloscopus collybita*
Lù bianco *Phylloscopus bonelli*
Lù verde *Phylloscopus sibilatrix*

Acrocephalidae

Canapino comune *Hippolais polyglotta*

Sylviidae

Capinera *Sylvia atricapilla*
Beccafico *Sylvia borin*
Bigiarella *Sylvia curruca*
Sterpazzola *Sylvia communis*
Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

Regulidae

Fiorrancino *Regulus ignicapilla*
Regolo *Regulus regulus*

Troglodytidae

Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

Sittidae

Picchio muratore *Sitta europaea*

Tichodromidae

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

Certhiidae

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*
Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

Sturnidae

Sturno *Sturnus vulgaris*

Turdidae

Merlo dal collare *Turdus torquatus*
Merlo *Turdus merula*
Cesena *Turdus pilaris*
Tordo sassello *Turdus iliacus*
Tordo bottaccio *Turdus philomelos*
Tordela *Turdus viscivorus*

Muscicapidae

Pigliamosche *Muscicapa striata*
Pettiroso *Erithacus rubecula*
Usignolo *Luscinia megarhynchos*
Balia nera *Ficedula hypoleuca*
Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochrurus*
Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*
Codirossone *Monticola saxatilis*
Stiaccino *Saxicola rubetra*
Saltimpalo *Saxicola rubicola*
Culbianco *Oenanthe oenanthe*
Monachella *Oenanthe hispanica*



Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Passeridae

Passera d'Italia *Passer italiae*

Passera mattugia *Passer montanus*

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Prunellidae

Sordone *Prunella collaris*

Passera scopaia *Prunella modularis*

Motacillidae

Ballerina gialla *Motacilla cinerea*

Ballerina bianca *Motacilla alba*

Calandro *Anthus campestris*

Pispola *Antus pratensis*

Prispolone *Anthus trivialis*

Spioncello *Anthus spinoletta*

Fringillidae

Fringuello *Fringilla coelebs*

Peppola *Fringilla montifringilla*

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

Verdone *Chloris chloris*

Fanello *Linaria cannabina*

Crociera *Loxia curvirostra*

Cardellino *Carduelis carduelis*

Verzellino *Serinus serinus*

Lucherino *Spinus spinus*

Emberizidae

Strillozzo *Emberiza calandra*

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*

Zigolo muciatto *Emberiza cia*

Ortolano *Emberiza hortulana*

Zigolo nero *Emberiza cirius*

Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus*

Calcaridae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

Bibliografia

- BOSA A., 2016. Migrazioni post-riproduttive nei valichi prealpini della catena delle Tre Croci. Relazione per *Veneto Agricoltura*: 32 pp.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2015: Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. *Riv. Ital. Orn.*, 85: 31-50.
- DE FRANCESCHI P., 1991: Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 9: 154.
- LERCO R., SIGHELE M., 2016: Monitoraggio del grillaio (*Falco naumanni*) in provincia di Verona: dati preliminari (Falconiformes: Falconidae). In Atti del 7° Convegno dei Faunisti Veneti, *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*, suppl. al vol. 66: 184-187.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2007: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2006. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 24.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2008: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2007. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2009: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2008. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2010: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2009. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2011: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2010. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2012: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2011. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2013: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2012. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2014: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2013. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.



Monachella sul Monte Loffa - Giacomo Sighele

Birdwatching a Verona e in Lessinia

Verona Birdwatching (VR BW) è un'associazione per la divulgazione del *birdwatching* e la salvaguardia dell'avifauna, attiva principalmente in provincia di Verona.

VR BW è impegnata nella ricerca e nei monitoraggi e ha una particolare predilezione per il territorio della Lessinia. Tra le indagini in corso si ricordano quelle sulla situazione riproduttiva del gufo reale, sul passaggio o la sosta post-riproduttiva del falco pecchiaiolo, del grillaio e del piviere tortolino.

VR BW è attiva anche nel campo della divulgazione, con conferenze tematiche come quella sui rapaci diurni della Lessinia che si è tenuta ad Erbezzo nel mese di agosto 2014.

www.veronabirdwatching.org

info@veronabirdwatching.org - 045 8301375





**Parco Naturale Regionale della Lessinia
Comunità Montana della Lessinia**

Piazza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
www.lessinia.verona.it - parcocultura@lessinia.verona.it
tel.: 045 6799211 - fax: 045 6780677



Associazione Verona Birdwatching

www.veronabirdwatching.org - info@veronabirdwatching.org

