

resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2011





© Copyright 2012 Parco Naturale Regionale della Lessinia - Comunità Montana della Lessinia
Associazione Verona Birdwatching

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura di), 2012: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia.
Anno 2011. Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching, pp. 32.

In copertina: fringuello alpino, di Paolo Parricelli.
In terza e quarta di copertina: birdwatcher a Castelberto e al Pigarolo, di Carla Chiappisi.



resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2011

a cura di

Maurizio Sighele
Paolo Parricelli





Presentazione

Il monitoraggio delle specie animali è uno dei compiti più importanti svolti da un Parco Naturale Regionale. Tale attività è indispensabile per avere dati precisi e affidabili sullo status e l'evoluzione delle varie popolazioni. Tra tutte le classi animali, gli uccelli rappresentano senz'altro una delle componenti più significative e spettacolari, alla cui bellezza e suggestione non è facile sottrarsi. Sono però, prima di tutto, tra gli indicatori più vistosi, più immediati e più sensibili dello stato di salute dei loro habitat naturali.

La Comunità Montana della Lessinia, ente gestore del Parco Naturale Regionale, ha pertanto programmato la pubblicazione annuale di questo resoconto, giunto alla sua sesta edizione, nel quale sono riportate in forma semplice e chiara le informazioni ornitologiche ritenute più interessanti. Definire strategie e azioni volte alla tutela e valorizzazione di questo straordinario patrimonio naturale, con particolare attenzione nei confronti delle specie di maggior valore ecologico e conservazionistico, è un doveroso impegno da perseguire con la massima attenzione.

Un ringraziamento all'associazione Verona Birdwatching e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione con un competente, impegnativo e appassionato lavoro di osservazione "sul campo". L'opuscolo, ricco di dati qualificati e pregevoli illustrazioni, oltre a rappresentare una solida base per chi pratica l'attività di ricerca scientifica, potrà senz'altro essere un utile sussidio per la scuola e per tutti coloro che intendono approfondire le proprie conoscenze sullo straordinario mondo degli uccelli.

Paolo Garra

Presidente della Comunità Montana della Lessinia
Parco Naturale Regionale



Cicogna nera a Malga Saibe - Luca Signori

Introduzione

In questo sesto resoconto sono annotate le segnalazioni più significative attinenti all'avifauna selvatica osservata nel 2011 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia e nelle aree limitrofe. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza per la nidificazione, lo svernamento, gli erratismi, la curiosità o l'interesse locale. Sono stati raccolti e analizzati alcune migliaia di dati riferiti a 144 specie diverse di uccelli. Salgono a 162 le specie segnalate in questi sei anni di resoconti.

Tra le segnalazioni più interessanti rilevate nel corso del 2011 si sottolineano: la scoperta di una terza coppia territoriale di gufo reale; la presenza di un maschio di re di quaglie in periodo riproduttivo; le ripetute osservazioni di almeno due individui di cicogna nera; lo svernamento di un cospicuo numero di zigoli delle nevi e di un raggruppamento di circa trenta aironi guardabuoi, ardeide mai segnalato in Lessinia in precedenza; le segnalazioni di specie inusuali come albanella minore, piovanello pancianera, piro piro piccolo, gruccione, canapino maggiore e, a quote più basse, anche garzetta e martin pescatore.

La maggior parte delle segnalazioni proviene dalla rete dell'associazione Verona Birdwatching, che ha raccolto le osservazioni effettuate durante il tempo libero da parte dei suoi associati, dal personale del Servizio Guardiaparco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Corpi di Polizia Provinciale di Verona e Vicenza e di Veneto Agricoltura durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio. Alcune segnalazioni sono pervenute anche da appassionati, escursionisti e residenti.

Tutte le immagini all'interno di questo resoconto sono state scattate in Lessinia nel corso del 2011. La tassonomia segue le indicazioni della B.O.U. (SANGSTER *et al.*, 2010-2011).

Hanno contribuito alla stesura di questa pubblicazione: Mick Allen, Daniele Andriolo, Cristian Avesani, Simone Balbo, Domenico Benciolini, Alessandro Berardo, Domenico Bernasconi, Paolo Bertini, Alberto Bosa, Rosalba Boscaini, Giorgio Boschi, Giuseppe Boselli, Michele Bottazzo, Romeo Cappelletti, Chiara Castagna, Ernesto Cavallini, Carla Chiappisi, Angelo Corradi, Bruno Corradi, Valentina Corradi, Alessandra Corso, Fabrizio Croci, Marianna Dalla Riva, Michele Dall'O, Giangaetano Dalle Vedove, Mauro Della Toffola, Mauro D'Offria, Igino Falco, Vittorio Fanelli, Carlotta Fassina, Gianni Ferrarese, Claudino Gandini, Simona Inaudi, Cristiano Izzo, Roberto Lerco, Alessandro Leso, Francesco Leso, Raffaele Leso, Maurizio Lezzi, Marco Mastrorilli, Luca Mazzola, Francesco Melotti, Ugo Monicelli, Roberto Nordera, Massimino Ovatoli, Cinthia Panarotto, Paolo Panarotto, Paolo Parricelli, Fabio Pegoraro, David Peirone, Gianluca Perlato, Antonio Petronio, Anna Pigozzo, Giulio Piras, Roberto Pistollato, Daniele Ponticello, Massimo Samaritani, Andrea Saorin, Agostino Sartori, Elio Sauro, Massimo Sauro, Graziano Scandola, Leopoldo Scandola, Greta Serafin, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Luca Signori, Dorino Stocchero, Paola Tarasco, Dario Valbusa, Fulvio Valbusa, Emanuele Vendramin, Roberta Vignola, Maurizio Zantedeschi, Corrado Zanini.

Le osservazioni più interessanti del 2011

Germano reale

Anatra piuttosto comune, segnalata irregolarmente in Lessinia.

Alcuni indd. a San Giovanni Ilarione ai primi di settembre (P. Panarotto).

Anas platyrhynchos

Francolino di monte *Bonasa bonasia*

I rilevamenti del 2011 confermano che questo elusivo tetraonide è presente esclusivamente nella Foresta Demaniale Regionale di Giazza e nelle aree boscate situate in territorio trentino nei pressi di Castelberto.

1 cp. in Val di Revolto ripetutamente avvistata durante tutto il corso dell'anno, con rilevamento di una covata di 4 pulli il 2.06 (R. Nordera, R. Cappelletti, G. Perlato, L. Signori *et al.*).

Fagiano di monte *Tetrao tetrix*

Le aree del Parco occupate da questa specie sono situate in Lessinia nord-orientale. Difficilmente contattabile all'infuori del periodo riproduttivo, i monitoraggi eseguiti confermano la flessione numerica già registrata negli anni scorsi. Nei censimenti primaverili nelle arene di canto abitualmente monitorate, tra il 18.04 e il 24.05:

4 mm. e 2 ff. al Valon, 3 mm. e 1 f. in Val Fraselle, 3 mm. tra Passo Lora e Passo Zevola, 6 mm. e 3 ff. a Campobrun di Ala - TN (M. Bottazzo, P. Parricelli, G. Serafin, F. Valbusa, L. Signori, A. Saorin, A. Leso, D. Benciolini *et al.*).

Successivamente alcuni mm. in canto fino al 26.06 (R. Lerco). Inoltre:

1 ind. in canto al Bel Sengio, Cima Lobbia, il 10.04 (F. Pegoraro);

2 indd. in volo sul Valon il 20.08 (L. Signori).

Nei censimenti tardo estivi, per accertare il successo riproduttivo:

il 3, 10 e 16.09, tra il Valon e Cima Trappola-Bella Lasta, conteggiati 16 indd.: 1 f. con covata di solo 1 juv., 4 ff. senza covata,



9 mm. e 1 ind. (P. Parricelli, F. Valbusa, L. Signori, G. Serafin, C. Castagna, A. Saorin, A. Leso *et al.*);
il 26.08 e il 15.09, tra Passo Lora e l'alta Val Fraselle-Mesole, conteggiati 17 indd.:
3 ff. con 7 juv., 1 f. senza covata e 6 mm. (D. Stocchero, F. Pegoraro *et al.*).

Gallo cedrone

Tetrao urogallus

Raro e localizzato nelle aree boscate più mature, estese e tranquille. Le popolazioni della Lessinia e del Baldo sono di rilevante interesse poiché le più meridionali dell'intero arco alpino italiano. Anche nella primavera 2011 è stato avvistato un maschio "pazzo" nei pressi dell'abitato di Bosco Chiesanuova, a Corbane il 12.04 e a Maregge il 22.04 (P. Parricelli). Inoltre:

a Le Gosse: ripetute osservazioni di almeno 1 m. e 1 f., con ritrovamento di 1 nido con 6 uova schiuse ai primi di luglio (P. Parricelli, G. Serafin, L. Signori, A. Corradi *et al.*);
nella Foresta dei Folignani: fatte di 1 m. il 6.04, osservazione di 1 f. il 7.04 (P. Parricelli, G. Serafin) e di 1 m. il 18.04 (G. Scandola);
1 f. a Camposilvano a fine maggio (B. Corradi).

Coturnice

Alectoris graeca

Anche questo galliforme è poco comune e localizzato perlopiù nella Foresta Demaniale Regionale di Giazza, tra la Val di Revolto e l'alta Val del Chiampo (VI).

3 indd. sul Monte Grolla il 2.05 (P. Parricelli);
1 ind. al Pigarolo il 19.05 e 1 ind. il 30.07 (P. Parricelli, R. Lerco).

Cormorano

Phalacrocorax carbo

Segnalato nel mese di marzo, quando alcuni stormi disposti nella classica formazione a "V" sorvolano l'altopiano durante la migrazione dalle aree di svernamento a quelle di riproduzione.

31 indd. sopra il Vajo dell'Anguilla a Tander il 21.03 (P. Parricelli);
7 indd. sopra Passo Branchetto il 23.03 (P. Parricelli).

Airone guardabuoi

Bubulcus ibis

Prime segnalazioni di questo piccolo airone in Lessinia. Alla fine di dicembre è stato osservato un cospicuo raggruppamento nei pressi di Cerro V.se, con spostamenti diurni di piccoli stormi per motivi trofici in aree distanti anche alcune decine di km in varie località di Bosco Chiesanuova, Grezzana, Erbezzo, Velo V.se, Roverè V.se e Selva di Progno. È noto lo svernamento di gruppi consistenti in aree montane sino a circa 1000 m slm (BRICHETTI & FRACASSO, 2003).

2 indd. a San Rocco di Piegara, 640 m slm, il 25.12 (C. Chiappisi);
30 indd. tra le contrade Grobbe, Regno, Zambelli e altre aree limitrofe a Cerro V.se il 26.12, a circa 780 m slm, 14 indd. il giorno successivo e ancora 30 indd. il 16.01.2012 (C. Gandini, M. Sauro, P. Parricelli, G. Serafin, M. Sighele, L. Signori *et al.*). Successivamente sono stati rilevati in diverse località della Lessinia per tutto il mese di gennaio 2012.

Garzetta***Egretta garzetta***

Prima segnalazione di questo ardeide, seppure ai margini del Parco. Ai primi di settembre, col Torrente Alpone in secca e la conseguente moria di pesci, un gruppo di aironi cenerini e di garzette ha trovato una facile risorsa alimentare. Circa 20 garzette, inoltre, si radunavano in dormitorio notturno nel centro di San Giovanni Ilarione (P. Panarotto).

Cicogna nera***Ciconia nigra***

Gli avvistamenti di questi ultimi anni attestano che il nostro altipiano è interessato dal transito e dalla sosta di alcuni individui durante la migrazione post-riproduttiva.

2-3 indd. sono stati segnalati a Bosco Chiesanuova per circa un mese a partire dalla metà di agosto, dapprima 1 ind. a Sauro il 15.08 (D. Valbusa), quindi 1 subad. a Masetto il 29.08 (R. Leso, F. Leso), 1 juv. a Malga Saibe il 7.09 (L. Signori), 1 juv. a San Giorgio il 9.09 (D. Ponticello) e 1 ind. a Masetto l'11.09 (G. Boselli).

Falco pecchiaiolo***Pernis apivorus***

Migratore trans-sahariano nidificante nelle aree boscate situate perlopiù a quote poco elevate. La Lessinia è anche interessata da un consistente passo migratorio post-riproduttivo, tra la metà agosto e la prima decade di settembre. La prima osservazione in alta Lessinia è quella di 11 indd. l'11.05 a Castelberto (L. Mazzola), mentre in periodo riproduttivo, in giugno e luglio, è stato segnalato a San Giorgio, a Maregge, ai Merli, nel Vajo dell'Anguilla, a Vallene, al Pigarolo e verso Cima Lobbia (C. Izzo, U. Monicelli, D. Bernasconi, R. Lerco *et al.*).

Nibbio bruno***Milvus migrans***

Rapace migratore che predilige la vicinanza di corsi e specchi d'acqua, nel periodo estivo frequenta le pozze d'alpeggio degli alti pascoli per motivi trofici. La prima segnalazione dell'anno è quella di 1 ind. ai Folignani l'8.04 (P. Parricelli); in seguito singole osservazioni provengono da Malga Lessinia, Castelberto, Podestaria, Valon, Giazza e Campofontana tra il 30.04 e l'11.08 (M. Allen, M. Sighele, E. Cavallini, D. Bernasconi, P. Parricelli, C. Izzo, C. Chiappisi, M. D'offria, U. Monicelli *et al.*).

Biancone***Circaetus gallicus***

Aquila migratrice specializzata nella caccia di rettili, nidifica irregolarmente nell'area del Parco, perlopiù nei settori centro-orientali. La prima osservazione del 2011 è di 1 ind. a Campofontana il 10.04 (F. Pegoraro), l'ultima di 1 ind. sul Monte Pastello l'11.09 (V. Fanelli). Durante il periodo riproduttivo:

nella zona dell'alto Vajo dell'Anguilla, di Podestaria e di Castelberto: osservazioni di singoli individui in attività trofica tra l'11.07 e l'8.09 (M. Sighele, R. Vignola, A. Berardo, G. Piras, L. Mazzola, M. Lezzi, L. Signori *et al.*);

tra Maregge e Bocca di Selva: segnalazioni anche di 3 indd. insieme tra il 3 e il 22.08 (G. Dalle Vedove, A. Berardo, D. Bernasconi, R. Boscaini, L. Signori *et al.*); tra Branchetto e San Giorgio: osservazioni a partire dal 26.04, con frequenti

segnalazioni anche di 3 indd. tra il 9.07 e il 3.09 (D. Bernasconi, M. Ovatoli, R. Pistollato, C. Zanini, A. Pigozzo *et al.*);
a Dosso Alto: 2 indd. l'8.05 (G. Perlato);
tra il Pigarolo e la Val di Revolto: 1-2 indd. tra il 4.06 e il 20.08 (M. & G. Sighele, M. Allen, R. Lerco, D. Bernasconi *et al.*);
1 ind. ai Covoli di Velo il 12.06 (M. D'offria);
1 cp. ha probabilmente nidificato a Cava Belloca, Tregnago, segnalata a partire dalla seconda metà di maggio, con osservazione di 1 juv. involato il 18.07 (R. Lerco, C. Chiappisi, G. Dalle Vedove, C. Izzo *et al.*).

Falco di palude

Circus aeruginosus

Elegante rapace avvistato in Lessinia durante il transito migratorio, di cui si conosceva una sola segnalazione prima di questi resoconti.

- 1 ind. a Santa Viola il 9.05 (M. D'offria);
- 1 ind. ai Tracchi il 23.06 (P. Parricelli);
- 1 ind. a Castelberto il 21.08 (M. D'offria) e 1 ind. il 3.09 (gruppo VR BW).

Albanella reale

Circus cyaneus

Ogni anno qualche individuo viene avvistato durante i passi migratori, mentre è assai raro lo svernamento.

- 2 ff. a Santa Viola il 9.05 e 1 f. il 10.05 (M. D'offria);
- 1 ind. sul Monte Grolla il 20.11 (G. Perlato).



Albanella minore

Circus pygargus

Specie poco frequente in Lessinia, l'ultima segnalazione nota risaliva al maggio 2005. Viste le numerose osservazioni del 2011 in periodo pre-riproduttivo, è verosimile che questo rapace sia assai più regolare di quanto finora accertato.

1 f. a Santa Viola il 15.04, 2 ff. il 4.05, 1 f. il 5.05, 1 f. il 9.05 (M. D'offria);
1 ind. a Castelberto il 21.08 (M. D'offria).

Astore

Accipiter gentilis

Rapace di bosco particolarmente elusivo, con effettivi presenti probabilmente sottostimati. Le zone di maggior presenza coincidono perlopiù con le aree forestali più mature e tranquille.

1 ind. nei pressi di Cerro V.se il 2.01 (S. Inaudi *et al.*).

tra Vallene e il Corno d'Aquilio: 1 ind. il 29.10 e il 15.11 (C. Izzo, M. Allen, C. Zanini);

tra Maregge e i Tracchi 1 ind. l'1 e il 14.08 (G. Dalle Vedove, S. Balbo);

tra i Tracchi e Bocca di Selva: 1 ind. il 26.06 e il 18.11 (D. Bernasconi, R. Lerco);

nell'alto Vajo dell'Anguilla: 1 ind. ad Arbi di Cornicello il 19.06 (M. D'offria); 1 ind.

nei pressi del ponte dell'Anguillara il 17.07 e 2 indd. il 29.10 (C. Izzo, M. Allen);

1 ind. alla Bocchetta della Vallina il 7.05 e 1 ind. il 20.07 (M. D'offria *et al.*);

sul Valon: 1 ind. l'11.07, il 16.08 e il 18.11 (M. Sighele, M. D'offria);

1 ind. a Dosso Alto il 27.03 (P. Parricelli, G. Serafin);

1 ind. in *mobbing* su corvo imperiale a Cima Lobbia il 30.07 (C. Izzo, U. Monicelli).

Aquila minore

Aquila pennata

Terza segnalazione per il Parco di questo rapace migratore di dimensioni poco maggiori di una poiana.

2 indd. in Valsquaranto il 14.08 (C. Izzo).

Aquila reale

Aquila chrysaetos

Specie facilmente avvistabile soprattutto nel settore centro-orientale dell'altipiano, una coppia nidifica regolarmente nell'area della Foresta di Giazza dove si conoscono tre siti riproduttivi. La Lessinia è interessata anche dall'attività trofica compiuta dalla coppia nidificante sul vicino massiccio del Monte Baldo e dalla presenza di giovani in dispersione e subadulti non accoppiati. La specie è stata segnalata durante tutto l'arco dell'anno dal Corno d'Aquilio all'alta Val del Chiampo, con maggiore frequenza nell'alto Vajo dell'Anguilla, nei dintorni di San Giorgio e nell'area della Foresta di Giazza. Si ricordano solo le osservazioni in aree insolite e quelle di individui dell'anno:

1 ind. a Cerro V.se il 4.02 e 1 subad. a Santa Viola il 15.04 e il 2.05 (M. D'offria);

1 juv. tra Gaibana e il Valon il 25.09 con una marmotta appena catturata tra gli artigli, poi persa nei pressi di San Giorgio (P. Parricelli);

Si segnala che il 28.02 a Recoaro Terme (VI), nell'alveo del Torrente Agno, è stata recuperata dalla Polizia Provinciale di Vicenza un'aquila del secondo anno fortemente debilitata. Tale esemplare, curato presso il Centro Recupero Provinciale



del Lago di Fimon (VI), è stato reimpresso in libertà il 28.04 sul Monte Falcone, Recoaro Terme (VI), munito di anello metallico applicato al tarso destro. Una volta liberato si è diretto verso la Val Fraselle (D. Stocchero).

Falco cuculo

Falco vespertinus

Falco migratore che compie rotte migratorie diverse per andare e tornare dai siti di nidificazione, localizzati in particolar modo in Russia e in Ungheria: in primavera il transito coinvolge l'Italia, e per questo è di presenza quasi regolare anche nel Parco (DE FRANCESCHI & PARRICELLI, 2002), mentre dopo il periodo riproduttivo la migrazione interessa prevalentemente i Balcani, cosicché in Lessinia risulta assai scarso nel periodo tardo-estivo.

1 ind. tra Dossetti e Zamberlini il 10.05 (P. Parricelli);

1 ind. a Castelberto il 21.08 (M. D'offria).

Smeriglio

Falco columbarius

Piccolo falco migratore che visita l'Italia nei mesi invernali, frequentando le zone di pianura, segnalato raramente in Lessinia nei mesi più freddi (SIGHELE & PARRICELLI, 2008), più frequente durante il passo migratorio:

1 ind. a Campofontana il 10.04 (F. Pegoraro).

Lodolaio***Falco subbuteo***

Specie segnalata per la prima volta nel Parco solo nel 2007, ma da allora regolarmente contattata ogni anno (SIGHELE & PARRICELLI, 2008-2011).

- 1 ind. a San Giorgio il 7.05 e 1 ind. il 19.05 (D. Bernasconi);
- 1 ind. sul Monte Pastello il 3.07 (C. Zanini, M. Dalla Riva);
- 1 ind. a Velo V.se il 17.07 e 1 ind. il 27.08 (C. Izzo);
- 1 ind. che ha catturato una rondine ai Parpari il 17.08 (A. Berardo);
- 1 ind. a Bocca di Selva il 26.08 (G. Piras, C. Fassina).
- 1 ind. a Castelberto il 27.08 e 1 ind. il 3.09 (gruppo VR BW).

Falco pellegrino***Falco peregrinus***

Per questo formidabile predatore dell'aria gli ultimi decenni hanno fatto registrare una tendenza sicuramente positiva, con un buon incremento numerico e una notevole espansione territoriale. Paiono occupate la maggior parte delle valli del Parco dove insistono pareti rocciose ricche di cavità utili alla nidificazione, in particolare in Val di Revolto, in Val Squaranto, nel Vajo dell'Anguilla e nell'alta Valpantena (P. Parricelli, M. D'offria, C. Izzo, U. Monicelli *et al.*).

Re di quaglie***Crex crex***

Rallide assai elusivo segnalato di rado in Lessinia, esclusivamente durante i passi migratori. Nell'estate del 2011 per la prima volta è stata accertata la presenza di un maschio cantore in periodo riproduttivo. Nelle aree di presenza italiane, situate nelle zone prealpine centro-orientali, la popolazione è di difficile valutazione per poliginia diffusa, estrema mobilità dei maschi e presenza di maschi territoriali non accoppiati (BRICHETTI & FRACASSO, 2004).

- 1 m. in canto ai Merli tra l'8 e il 19.07 (D. Valbusa, L. Scandola, P. Parricelli, G. Serafin, M. & G. Sighele *et al.*).

Pavonella***Vanellus vanellus***

Questa specie tipica delle zone di pianura e assai numerosa nelle risaie veronesi, è sporadicamente osservata in Lessinia nei mesi invernali.

- 10 indd. in volo a Badia Calavena l'1.01 (M. Mastrotrilli).

Piovanello pancianera***Calidris alpina***

Prime segnalazioni di questo limicolo nel territorio del Parco.

- 4 indd. nei pressi di San Giorgio l'8.11 e 1 ind. il 12.11 (M. D'offria, C. Izzo).

Beccacino***Gallinago gallinago***

Limicolo considerato tra i più comuni in Lessinia nei periodi migratori (SAURO, 1982).

- 1 ind. ai Folignani di Cima il 13.09 (P. Parricelli);
- 3-6 indd. a San Giorgio tra il 29.10 e l'1.11 e 2 indd. il 13.11 (M. Allen, C. Izzo, P. Bertini, M. Sighele *et al.*);
- 1 ind. a Passo Branchetto il 31.10 (M. Sighele, R. Vignola).



Lodolaio che ha catturato una rondine
ai Parpari - *Alessandro Berardo*

Piro piro piccolo***Actitis hypoleucos***

Prime segnalazioni per il Parco di questa specie scarsa nell'arco alpino anche se raramente può nidificare o svernare (BRICHETTI & FRACASSO, 2004).

- 1 ind. alla Bocchetta della Vallina il 25.07 (P. Bertini);
- almeno 1 ind. a San Giovanni Ilarione il 2.09 (P. Panarotto).

Piro piro culbiano***Tringa ochropus***

Nuova osservazione di questa specie in Lessinia. Si tratta della prima segnalazione durante la migrazione pre-riproduttiva, mentre le precedenti erano riferite al mese di agosto (SIGHELE & PARRICELLI, 2008-2009).

- 1 ind. a Malga Roste, nei pressi dei Parpari, il 9 e il 10.04 (G. Perlato);
- 1 ind. a Branchetto l'11.05 (P. Parricelli).

Piro piro boschereccio***Tringa glareola***

Come il piro piro culbiano, anche questo limicolo visita il Parco abbastanza regolarmente durante la migrazione post-riproduttiva.

- 5 indd. a Malga Marianetto il 19.07 (R. Boscaini);
- 2 indd. nei pressi di San Giorgio l'1 e il 16.08 (G. Dalle Vedove, M. D'offria).

Tortora dal collare***Streptopelia decaocto***

Negli ultimi anni una piccola popolazione si è stabilmente insediata tra Rosaro, Cerro V.se, Corbiolo e aree limitrofe, zone situate a quote elevate precedentemente non occupate.



15 indd. a Cerro V.se il 2.01 (S. Inaudi, M. Della Toffola);
alcuni indd. a Praole, Cerro V.se, il 19.06 (M. Sighele);
1 ind. nei pressi di Masselli di Erbezzo il 13.08 (R. Lerco).

Assiolo

Otus scops

Piccolo rapace notturno migratore, presente in Lessinia durante i mesi estivi, spesso nidificante (SIGHELE & PARRICELLI, 2009-2011).

1 ind. in canto alla Bocchetta della Vallina il 23.04 (P. Bertini *et al.*);
1 ind. in Val Sguerza, Velo V.se, il 5.06 (P. Parricelli).

Gufo reale

Bubo bubo

Da qualche anno è stato avviato un monitoraggio mirato volto ad accertare consistenza e aree di riproduzione nel Parco di questo maestoso strigiforme. Confermata la presenza nella Valle dei Progni di Fumane e nell'alta Valpantena, dove è stata accertata la nidificazione con 2 pulli osservati a partire dal 12.06 (C. Izzo, P. Parricelli, G. Serafin, M. D'offria, M. Sighele *et al.*). Nel 2011 è stata rilevata la presenza di una terza coppia in alta Val d'Illasi, dove sono stati uditi in canto 1 m. e 1 f. (P. Parricelli, L. Signori, G. Perlato, G. Boschi, M. Dall'O *et al.*). 1 ind. ferito da arma da fuoco è stato recuperato in Valpolicella ai primi di novembre e successivamente liberato a Prun il mese successivo. Al di fuori dei siti noti:

1 ind. avvistato in alta Val Squaranto il 27.03 (C. Avesani, F. Melotti);
1 ind. tra San Giorgio e Malga Malera di Sotto il 18.05 (E. Sauro *et al.*);
1 ind. nel Vajo delle Cavazze il 15.12 (E. Vendramin), forse uno degli indd. presenti in alta Valpantena.



**Civetta*****Athene noctua***

Piccola strigide occasionalmente osservabile anche in pieno giorno, soprattutto nella stagione invernale. Utilizza di frequente abitazioni e edifici rurali sia come rifugi diurni sia come siti di nidificazione. Presente in Lessinia fino a circa 1.200 m di quota.

1 ind. ripetutamente avvistato a Ragazzini, Erbezzo, durante tutto il corso dell'anno (G. Ferrarese, C. Chiappisi, P. Parricelli);

1 ind. in canto udito più volte nel periodo estivo a Bosco Chiesanuova (P. Parricelli);

1 ind. ai Merli il 16.07 (C. Izzo, C. Chiappisi, M. D'offria);

1 ind. in Val di Revolto il 31.10 (M. Sighele, R. Vignola).

Gufo comune***Asio otus***

Specie elusiva legata ad aree boscate, anche limitrofe ai centri abitati, circondate da ampi spazi aperti utilizzati per la caccia di micromammiferi. In inverno forma raggruppamenti diurni (*roost*) che possono comprendere numerosi esemplari.

1 ind. a San Giorgio l'11.08 (L. Signori *et al.*).

Civetta capogrosso***Aegolius funereus***

Strigiforme di montagna la cui distribuzione è strettamente legata a quella del picchio nero, del quale occupa di frequente le cavità nido per riprodursi o quali siti di riposo diurno. Nel Parco è presente soprattutto nella Foresta dei Folignani e nella Foresta Demaniale Regionale di Giazza.

1 ind. a Malga Derocon il 4.04 (P. Parricelli, G. Serafin);

1 ind. al Pigarolo il 4.06 (M. Sighele).

Il 26.03 è stato recuperato 1 ind. debilitato che portava un anello identificativo svizzero applicato a un soggetto adulto nel Vaud, a Sainte-Croix, il 21.05.2008. È stato in seguito rilasciato il 19.05 a Malga Derocon (F. Croci).

Succiacapre***Caprimulgus europaeus***

Specie visitatrice estiva dalle abitudini crepuscolari e notturne con caratteristico canto che ricorda il verso del grillotalpa. La popolazione nel Parco è probabilmente sottostimata per carenza di ricerche mirate, di solito è contattato in canto o avvistato in caccia notturna lungo la rete stradale, tra maggio e luglio.

1 ind. a Malga Saibe il 18.05 (P. Parricelli);

- 1 ind. nel Vajo Lungo il 15.07 (M. Dall'O);
- 1 ind. alla Bocchetta della Vallina il 21.07 (L. Mazzola);
- 1 ind. nei pressi di Scandole il 23.07 (M. Dall'O);
- 1 ind. a Malga Lessinia il 30.08 (L. Mazzola).

Rondone pallido

Apus pallidus

Rondone di difficile identificazione, segnalato irregolarmente nei passaggi migratori post-riproduttivi.

- 5-6 indd. sopra Corso il 13.08 (R. Lerco).

Martin pescatore

Alcedo atthis

Prima segnalazione di questa specie legata agli specchi e ai corsi d'acqua.

- almeno 1 ind. a San Giovanni Ilarione ai primi di settembre (P. Panarotto).

Gruccione

Merops apiaster

Prima segnalazione in alta Lessinia di questo variopinto migratore.

- 1 ind. a Spiazzi il 17.08 (A. Berardo).

Upupa

Upupa epops

Anche nel 2011 ha probabilmente nidificato a Malga Masetto di Bosco Chiesanuova, dove sono stati ripetutamente avvistati 2 adulti a partire dall'8.04 sino a fine luglio, a una quota particolarmente elevata per la specie, 1425 m slm (E. Scandola, P. Parricelli, G. Serafin, L. Signori). Al di fuori dei periodi migratori, inoltre:

- 1 ind. nei pressi di Erbezzo il 3.07 (G. Dalle Vedove);
- 1 ind. verso Zamberlini il 18.07 (G. Dalle Vedove).

Torcicollo

Jynx torquilla

Picchio migratore osservato regolarmente durante i passi, meno frequente durante il periodo riproduttivo, un tempo rilevato fino ai 900-1000 m (DE FRANCESCHI, 1991), mentre recentemente in Lessinia è stato segnalato nidificare fino ai 1700 m slm (SIGHELE & PARRICELLI, 2009). Si segnalano:

- 1 ind. a Malga Sega l'8.06 (P. Parricelli);
- 1 ind. ai Folignani di Cima il 18.06 (P. Parricelli).

Picchio nero

Dryocopus martius

Specie strettamente legata alle formazioni forestali più integre e mature. Nel Parco è abbastanza comune nella Foresta dei Folignani, nell'alta Val Squaranto e nella Foresta Demaniale Regionale di Giazza. Si riportano le segnalazioni rilevate al di fuori di queste aree:

- 1-2 indd. sul Monte Pastello il 9.04 (M. Sighele);
- 1 ind. tra i Tracchi e Branchetto il 16.04 (M. Sighele, R. Lerco *et al.*);
- 1 ind. a Santa Viola il 18.04 e il 22.09 (M. D'offria);
- 1 ind. nella Foresta Demaniale Regionale della Valdadige, a Campo, nel mese di giugno (P. Parricelli);
- 1 ind. nei pressi di Valbusa l'1.10 (C. Izzo).

Averla maggiore***Lanius excubitor***

Alcuni individui di questa specie, la più grande tra i Lanidi, svernano regolarmente nel Parco. Tradizionalmente occupati alcuni siti a Passo Fittanze, San Giorgio-Conca dei Parpari e, più a sud, nei pressi dell'abitato di San Rocco di Piegara.

1 ind. a San Rocco di Piegara il 31.10 e 1 ind. il 31.12, segnalato in seguito almeno fino a febbraio 2012 (P. Bertini, C. Izzo);

1 ind. nei pressi di San Giorgio l'8.11 (M. D'offria).

Gazza***Pica pica***

Corvide assai diffuso in pianura che pare stia espandendosi a quote più elevate anche in Lessinia.

1 ind. a Santa Viola, circa 800 m slm, il 27.09 (M. D'offria);

1 ind. a Gorgusello di Fumane, 770 m slm, il 20.11 (M. Dall'O).

Cornacchia nera***Corvus corone***

Specie solitamente contattata in periodo invernale, quasi sempre associata a grossi stormi della assai più comune congenere cornacchia grigia.

1 ind. a Cerro V.se il 2.01 (S. Inaudi *et al.*);

1 ind. a Velo V.se il 4.01 (R. Lerco);

2 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 26.02 (C. Izzo, U. Monicelli, M. Allen);

2 ind. a Vallene il 29.10 (C. Izzo, M. Allen);

1 ind. a Castelberto l'1.11 (G. Dalle Vedove);

1 ind. nei pressi di Taioli l'11.12 (D. Bernasconi);

1 ind. a San Francesco il 31.12 (P. Bertini, C. Izzo).

Tottavilla***Lullula arborea***

Il territorio del Parco occupato dagli alti pascoli e l'area pedemontana si confermano tra le più consistenti e regolari aree venete di nidificazione. Individui svernanti sono regolarmente contattati a quote meno elevate.

Topino***Riparia riparia***

Rondine che nidifica in scarpate sabbiose di pianura, spesso nei pressi di bacini o corsi d'acqua; si osserva sporadicamente nel Parco, erratica o in migrazione, terza segnalazione degli ultimi quattro anni (SIGHELE & PARRICELLI, 2009-2010).

1 ind. a Castelberto il 21.08 (M. D'offria).

Lui bianco***Phylloscopus bonelli***

Specie spiccatamente termofila legata alle formazioni arboree situate perlopiù sui versanti esposti e ben soleggiati. Di passo regolare in Lessinia, molto scarso e localizzato come nidificante.

1 ind. sopra a Erbezzo il 26.06 (R. Lerco);

1 ind. ai Merli il 20.08 (M. Sighele, R. Lerco).

Sterpazzola***Sylvia communis***

Anche nel 2011 si è confermata la presenza di questo silvide in periodo riproduttivo a quote particolarmente elevate, sino ad oltre i 1.700 m slm, con prime segnalazioni nella zona di San Giorgio a partire dal 3.05, dove si è rivelato nidificante piuttosto diffuso (P. Parricelli, M. D'offria *et al.*). Inoltre:

1 ind. nella Valle dell'Orsa l'8.06 (P. Parricelli);

1 ind. a Malga Bagorno il 18.06 (P. Parricelli).

Canapino maggiore***Hippolais icterina***

Passeriforme che nidifica in Europa centro-settentrionale e che sverna in Africa, soprattutto a sud dell'equatore. Non sono note precedenti segnalazioni nel Parco della Lessinia.

1 ind. a Branchetto il 20.08 (M. Sighele).

Picchio muraiolo***Tichodroma muraria***

Specie appariscente e inconfondibile, strettamente rupicola. Nella Lessinia veronese è segnalato quasi esclusivamente nel periodo invernale.

1 ind. a Gaspari il 19.01 (I. Falco);

2 indd. a Stallavena il 26.01 e 1 ind. alla vicina Torre del Falasco, dove già era stato segnalato il 29.12.2010 (SIGHELE & PARRICELLI, 2011), tra il 29.01 e il 12.02 (P. Panarotto, M. D'offria, M. Allen, C. Izzo, M. Sighele, R. Pistollato *et al.*); successivamente 1 ind. il 22.11 e 1 ind. il 23.12 (M. D'offria, P. Bertini);

1 ind. nel Vajo Marciora il 10.03 (P. Parricelli);

1 ind. nell'alto Vajo dell'Anguilla il 29.10 (C. Izzo, M. Allen);

1 ind. a Passo Pertica l'8.12 (L. Signori, G. Perlato).

Merlo acquaiolo***Cinclus cinclus***

Inscindibilmente legato ai pochi corsi d'acqua perenne presenti nel Parco nella Valle dei Progni di Fumane, nel Vajo Marciora fino a Bellori, a Giazza e in Val Fraselle e nell'alta Valle del Chiampo.



Picchio muraiolo a Gaspari - Igino Falco

Cesena***Turdus pilaris***

Qualche rara coppia di questo turdide nidifica regolarmente in Lessinia centrale. Alcuni individui sono stati contattati in periodo riproduttivo nelle aree boscate situate a nord di Bosco Chiesanuova, tra le località Tracchi e Branchetto (P. Parricelli) e a Bocchetta della Vallina il 23.04 (R. Lerco). Regolare presenza invernale di stormi talora assai consistenti:

50 e più indd. ai Parpari il 17.01 (M. D'offria);

100 e più indd. a Bocca di Selva il 16.02 (P. Parricelli);

100 e più indd. tra i Parpari e San Giorgio il 15.11 (P. Panarotto).

Codirosso spazzacamino***Phoenicurus ochruros***

Passeriforme comune e abbondante in tutta la Lessinia, si segnala una aberrazione di colore:

1 juv. leucistico a Malga Lessinia il 13.08 (M. Lezzi).

Codirossone***Monticola saxatilis***

Nel Veronese questa specie non è molto comune, ma è abbastanza ben rappresentata sui rilievi lessinici. Nonostante la vistosa livrea, questo turdide è assai elusivo e di non facile individuazione. Nel Parco nidifica nell'area degli alti pascoli ricchi di rocce affioranti a quote generalmente comprese tra i 1.300 e i 1.600 m.

almeno 1 cp. ha nidificato a Branchetto con prima segnalazione il 12.04;

osservata la coppia con l'imbeccata dal 21.05, è stata contattata in seguito almeno fino alla prima metà di settembre (M. Lezzi, R. Lerco, E. Cavallini, C. Izzo, C. Chiappisi, M. Sighele *et al.*);

2-4 cpp. a San Giorgio tra Campolevè, Malga Bazerna, Valon e Monte Sparavieri a partire dal 28.04; almeno 1 juv. segnalato dal 23.07, osservazioni proseguite fino a fine agosto (M. D'offria, P. Parricelli, A. Pigozzo, M. Allen, P. Panarotto, R. Pistollato *et al.*);

1 m. ai Parpari il 17.05 (A. Petronio *et al.*);

1 ind. sul Monte Grolla il 19.05 (P. Parricelli).

Passero solitario***Monticola solitarius***

Specie molto rara e localizzata, in Lessinia la sua presenza è stata finora accertata solo lungo il margine meridionale.

1 ind. nel Vajo Marciora il 13.08 (R. Lerco);

1 ind. alla Torre del Falasco, Stallavena di Grezzana, il 21.11 (M. D'offria).

Sordone***Prunella collaris***

Visitatore invernale poco numeroso e localizzato. Con i primi freddi una parte della popolazione nidificante sui vicini massicci del Carega raggiunge l'altipiano per trascorrervi il periodo invernale.

1-7 indd. a San Giorgio tra novembre 2010 e il 23.02 (R. Lerco, M. & G. Sighele, P. Parricelli, M. Allen, A. Pigozzo, P. Bertini *et al.*);

1-6 indd. a Bocca di Selva tra l'1.01 e il 18.02 (M. Ovatoli *et al.*);
16 indd. al Pigarolo il 27.01 (P. Parricelli);
2 indd. a Stallavena di Grezzana, 200 m s.l.m., il 5.02 (C. Izzo, U. Monicelli, R. Lerco,
M. Sighele).

L'inverno successivo:

12 indd. al Pigarolo il 31.10 (M. Sighele, R. Vignola);
3 indd. nei dintorni di Malga Malera il 18.11 (M. D'offria);
1 ind. a Bocca di Selva il 27.12 (R. Lerco).

Fringuello alpino

Montifringilla nivalis

Specie tipica degli ambienti rocciosi d'altitudine. Presente in Lessinia esclusivamente in periodo invernale, quando parte della popolazione che nidifica sul vicino massiccio del Carega raggiunge il nostro altipiano spinta dai rigori invernali.

1 ind. sul Monte Tomba il 23.01 (M. Sighele, R. Vignola);
8 indd. a Bocca di Selva il 25.02 (M. Ovatoli).

Cutrettola

Motacilla flava

Passeriforme tipico delle zone di pianura, osservato sporadicamente in Lessinia durante le migrazioni.

1 ind. a Campolevè il 21.05 (C. Izzo, M. Allen, C. Chiappisi).

Organetto

Carduelis flammea cabaret

Molto rare le segnalazioni in Lessinia di questo fringillide, esclusivamente in periodo invernale. Diversi anni orsono era stata accertata la nidificazione di questa specie nella fascia a pino mugo del versante meridionale del Monte Carega, in territorio trentino (DE FRANCESCHI, 1991).

5 indd. a Bocchetta della Vallina il 3.04 (M. Sighele).



Organetto a Bocchetta della Vallina - Maurizio Sighele



Crociere

Loxia curvirostra

Specie legata principalmente alle formazioni di resinose. In Lessinia è contattata perlopiù in periodo invernale, talvolta anche in notevoli concentrazioni. Si segnalano i raggruppamenti più consistenti:

- 10-30 indd. a Bosco Chiesanuova nel centro abitato così come a Masselli, Scandole, Pozzette, Baito dei Pastori, Croce, Zamberlini e Valdiporto, tra novembre 2010 e la prima metà di febbraio (P. Parricelli, M. D'offria, M. Sighele, R. Vignola *et al.*);
- 10 e più indd. ai Parpari di Sotto il 15.01 (I. Falco);
- 10 e più indd. sul Monte San Moro il 5.03 (C. Chiappisi).

Frosone

Coccothraustes coccothraustes

Specie poco comune, ma di regolare presenza in Lessinia, soprattutto durante i passi migratori e la stagione invernale.

- 1-4 indd. a Bosco Chiesanuova tra il 17.01 e il 4.02 (P. Parricelli, M. D'offria);
- alcuni indd. nei pressi di Sprea il 26.02 (C. Izzo, U. Monicelli, M. Allen);

alcuni indd. a Spiazzoi tra il 15 e il 31.10 e successivi conteggi di almeno 200 indd. l'8.11 (M. D'offria, P. Bertini);
70 indd. ca. sopra Cava Belloca il 24.10 (D. Andriolo);
1 ind. ai Folignani l'1.11 (G. Dalle Vedove);
1 ind. a Bocca di Selva il 12.11 (C. Izzo).

Zigolo delle nevi

Plectrophenax nivalis

Sicuramente una delle specie più rappresentative del Parco della Lessinia. Anche l'inverno 2011-2012 ha fatto registrare lo svernamento di un cospicuo numero di esemplari nell'oramai celebre *hotspot* di Bocca di Selva, come consueto meta di numerosi birdwatcher e fotonaturalisti provenienti anche da fuori regione.

fino a 18 indd. a Bocca di Selva tra il 20.12.2010 e il 23.02 (C. Zanini, M. Dall'O, M. D'offria, G. Perlato, M. Sighele, P. Parricelli *et al.*).



Zigoli delle nevi a Bocca di Selva - Paolo Parricelli

Zigolo muciatto

Emberiza cia

Specie elusiva poco comune nel Parco. Parzialmente sedentaria e migrante regolare. L'habitat riproduttivo più favorevole è rappresentato da cespuglietti con alberi radi, ai margini di terreni aperti, con prati aridi inframezzati da scarpate e piccole pareti rocciose con sfasciume affiorante sui magri pascoli dei versanti esposti prevalentemente a sud (DE FRANCESCHI, 1991). Si ricordano le segnalazioni in alta Lessinia:

1 ind. a sud di San Giorgio il 31.10 (P. Bertini).

Specie segnalate in Lessinia nel 2011

Anseriformes

Anatidae

Germano reale *Anas platyrhynchos*

Galliformes

Tetraonidae

Francolino di monte *Bonasa bonasia*

Fagiano di monte *Tetrao tetrix*

Gallo cedrone *Tetrao urogallus*

Phasianidae

Coturnice *Alectoris graeca*

Starna *Perdix perdix*

Quaglia comune *Coturnix coturnix*

Fagiano comune *Phasianus colchicus*

Pelecaniformes

Phalacrocoracidae

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Ciconiiformes

Ardeidae

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Garzetta *Egretta garzetta*

Airone cenerino *Ardea cinerea*

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*

Falconiformes

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

Nibbio bruno *Milvus migrans*

Biancone *Circaetus gallicus*

Falco di palude *Circus aeruginosus*

Albanella reale *Circus cyaneus*

Albanella minore *Circus pygargus*

Astore *Accipiter gentilis*

Sparviere *Accipiter nisus*

Poiana *Buteo buteo*

Aquila minore *Aquila pennata*

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Falconidae

Gheppio *Falco tinnunculus*

Falco cuculo *Falco vespertinus*

Smeriglio *Falco columbarius*

Lodolaio *Falco subbuteo*

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Gruiformes

Rallidae

Re di quaglie *Crex crex*

Charadriiformes

Charadriidae

Pavoncella *Vanellus vanellus*

Scolopacidae

Piovanello pancianera *Calidris alpina*

Beccaccino *Gallinago gallinago*

Beccaccia *Scolopax rusticola*

Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos*

Piro piro culbianco *Tringa ochropus*

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Columbiformes

Columbidae

Colombaccio *Columba palumbus*

Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*

Tortora selvatica *Streptopelia turtur*

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculo *Cuculus canorus*

Strigiformes

Strigidae

Assiolo *Otus scops*

Gufo reale *Bubo bubo*

Civetta *Athene noctua*

Allocco *Strix aluco*

Gufo comune *Asio otus*

Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

Apodiformes

Apodidae

Rondone comune *Apus apus*

Rondone pallido *Apus pallidus*

Rondone maggiore *Apus melba*

Coraciiformes

Alcedinidae

Martin pescatore *Alcedo atthis*

Meropidae

Gruccione *Merops apiaster*



Upupidae

Upupa *Upupa epops*

Piciformes

Picidae

Torcicollo *Jynx torquilla*

Picchio verde *Picus viridis*

Picchio nero *Dryocopus martius*

Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*

Passeriformes

Laniidae

Averla piccola *Lanius collurio*

Averla maggiore *Lanius excubitor*

Corvidae

Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*

Gazza *Pica pica*

Ghiandaia *Garrulus glandarius*

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*

Cornacchia nera *Corvus corone*

Cornacchia grigia *Corvus cornix*

Corvo imperiale *Corvus corax*

Regulidae

Regolo *Regulus regulus*

Fiorrancino *Regulus ignicapilla*

Paridae

Cinciarella *Cyaniste caeruleus*

Cinciallegra *Parus major*

Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*

Cincia mora *Periparus ater*

Cincia alpestre *Poecile montanus*

Cincia bigia *Poecile palustris*

Alaudidae

Tottavilla *Lullula arborea*

Allodola *Alauda arvensis*

Hirundinidae

Topino *Riparia riparia*

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*

Rondine *Hirundo rustica*

Balestruccio *Delichon urbicum*

Aegithalidae

Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Phylloscopidae

Lù bianco *Phylloscopus bonelli*

Lù verde *Phylloscopus sibilatrix*

Lù piccolo *Phylloscopus collybita*

Lù grosso *Phylloscopus trochilus*

Sylviidae

Capinera *Sylvia atricapilla*

Beccafico *Sylvia borin*

Bigiarella *Sylvia curruca*

Sterpazzola *Sylvia communis*

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

Acrocephalidae

Canapino maggiore *Hippolais icterina*

Canapino comune *Hippolais polyglotta*

Tichodromidae

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

Sittidae

Picchio muratore *Sitta europaea*

Certhiidae

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*

Troglodytidae

Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

Sturnidae

Storno *Sturnus vulgaris*

Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Muscicapidae

Merlo dal collare *Turdus torquatus*

Merlo *Turdus merula*

Cesena *Turdus pilaris*

Tordo bottaccio *Turdus philomelos*

Tordo sassello *Turdus iliacus*

Tordela *Turdus viscivorus*

Pigliamosche *Muscicapa striata*

Pettiroso *Erithacus rubecula*

Balia nera *Ficedula hypoleuca*

Codiroso spazzacamino *Phoenicurus ochrurus*

Codiroso comune *Phoenicurus phoenicurus*

Codirossone *Monticola saxatilis*

Passero solitario *Monticola solitarius*

Stiaccino *Saxicola rubetra*

Saltimpalo *Saxicola torquatus*

Culbianco *Oenanthe oenanthe*

Prunellidae

Passera scopaiola *Prunella modularis*

Sordone *Prunella collaris*

Passeridae

Passera d'Italia *Passer domesticus italiae*

Passera mattugia *Passer montanus*

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Motacillidae

Cutrettola *Motacilla flava*
Ballerina gialla *Motacilla cinerea*
Ballerina bianca *Motacilla alba*
Calandro *Anthus campestris*
Prispolone *Anthus trivialis*
Pispola *Anthus pratensis*
Spioncello *Anthus spinoletta*

Fringillidae

Fringuello *Fringilla coelebs*
Peppola *Fringilla montifringilla*
Verzellino *Serinus serinus*
Verdone *Carduelis chloris*
Cardellino *Carduelis carduelis*

Lucherino *Carduelis spinus*
Fanello *Carduelis cannabina*
Organetto *Carduelis flammea cabaret*
Crociere *Loxia curvirostra*
Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*
Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

Emberizidae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*
Zigolo giallo *Emberiza citrinella*
Zigolo nero *Emberiza cirrus*
Zigolo muciatto *Emberiza cia*
Ortolano *Emberiza hortulana*
Strillozzo *Emberiza calandra*



Bibliografia

- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2003: Ornitologia italiana - Vol. 1. *A. Perdisa Ed.*, Bologna: pp. 464.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2004: Ornitologia italiana - Vol. 2. *A. Perdisa Ed.*, Bologna: pp. 398.
- DE FRANCESCHI P., 1991: Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 9: 154.
- DE FRANCESCHI P.F., PARRICELLI P., 2002: Aquila reale, Pellegrino ed altri rapaci diurni in Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 25: 103-112.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., KNOX A.G., PARKIN D.T., SVENSSON L., 2010. Taxonomic recommendations for British birds: Sixth Report. *Ibis* 152: 180–186.
- SANGSTER G., COLLINSON J.M., CROCHET P.-A., KNOX A.G., PARKIN D.T., SVENSSON L., VOTIER S.C., 2011. Taxonomic recommendations for British birds: Seventh Report. *Ibis* 153: 883–992.
- SAURO E., 1982: La foresta dei Folignani. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 5: 127-130.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2008: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2007. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2009: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2008. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2010: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2009. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
- SIGHELE M., PARRICELLI P. (red.), 2011: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2010. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.



Birdwatching a Verona e in Lessinia

Verona Birdwatching (VR BW) è un'associazione per la divulgazione del *birdwatching* e la salvaguardia dell'avifauna, principalmente in provincia di Verona.

birdwatching, cioè osservazione degli uccelli in natura, una passione che permette di divertirsi all'aria aperta, che dà la possibilità di ammirare la straordinaria bellezza delle forme e dei colori degli uccelli, che fa sognare accompagnando con la mente i migratori durante i loro lunghi viaggi;

birdwatching: una passione che spinge chi la vive a soffermarsi, a osservare l'ambiente in modo approfondito, carpire ogni movimento, colore e suono dei suoi abitanti;

birdwatching: trascorrere il proprio tempo libero in contatto e in armonia con la natura, vivere con più intensità il passaggio delle stagioni, cogliere l'occasione per conoscere il proprio territorio e posti nuovi.

Tutti elementi che, quando conducono alla diffusione di informazioni e di dati (come questo resoconto), rendono questa attività un prezioso strumento per la valorizzazione e la tutela di tutto il nostro territorio.

VR BW è impegnata sia nella ricerca che nella divulgazione, con pubblicazioni sull'avifauna provinciale e con conferenze.

Da oltre dieci anni VR BW è anche una *mailing list*, il supporto informatico dove gli iscritti si scambiano informazioni e segnalazioni. Nel sito web dell'associazione si possono trovare suggerimenti sui siti più interessanti per l'avifauna veronese, l'elenco delle osservazioni più particolari, un forum di discussione, un'ampia galleria di immagini, registrazioni audio e filmati esclusivamente dalla provincia di Verona.

www.veronabirdwatching.org

info@veronabirdwatching.org - 045 8301375





**Parco Naturale Regionale della Lessinia
Comunità Montana della Lessinia**

Piazza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
www.lessiniapark.it - guardiaparco@lessiniapark.it
tel.: 045 6799211 - fax: 045 6780677



Associazione Verona Birdwatching

www.veronabirdwatching.org - info@veronabirdwatching.org

