resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2013

LESSINIA = MAGIA

Parco Naturale Regionale della Lessinia

Falco cuculo ai Parpari - ***Gianluca Perlato***

© Copyright 2014 Parco Naturale Regionale della Lessinia - Comunità Montana della Lessinia
Associazione Verona Birdwatching

Maurizio Sighele e Paolo Parricelli (a cura di), 2014: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2013. Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching, pp. 32.

In copertina: beccofrusone a Camposilvano, di Marco Boccafoli.
In quarta di copertina: monachella a Fosse, di Maurizio Sighele.

resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2013

a cura di

Maurizio Sighele
Paolo Parricelli

Zigolo delle nevi a Bocca di Selva - ***Sergio Rima***

Presentazione

Tra le tante aspettative dei visitatori di un'Area Protetta vi è senz'altro l'osservazione della fauna selvatica nel proprio ambiente naturale. Le variegate espressioni del mondo selvatico da sempre affascinano e attraggono l'essere umano e tra i suoi attori viventi quello degli uccelli è un universo costituito da forme, colori e suoni straordinari.

Con l'intento di conoscere e far conoscere uno degli aspetti più seducenti del patrimonio faunistico della nostra Area Protetta, l'Ente Gestore promuove e sostiene la realizzazione annuale del "Resoconto Ornitologico del Parco della Lessinia", giunto quest'anno alla sua ottava edizione.

Le informazioni raccolte nell'opuscolo, corredate da una corposa serie di pregevoli immagini, danno un significativo contributo alla conoscenza della biodiversità e della ricchezza faunistica del Parco e invitano a considerare con attenzione e rispetto il mondo degli uccelli e ad impegnarsi per la loro tutela e conservazione.

All'Associazione Verona Birdwatching e a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, partecipi alla vita della nostra Area Protetta con grande competenza, gratuito impegno e intensa passione, la più sentita gratitudine da parte del suo Ente Gestore.

Marco Pezzotti

Commissario Straordinario della Comunità Montana della Lessinia

Parco Naturale Regionale della Lessinia

Merlo acquaiolo - *Gianluca Perlato*

Introduzione

In questo ottavo resoconto sono annotate le segnalazioni più significative attinenti all'avifauna selvatica incontrata nel 2013 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia e nelle aree limitrofe. Le osservazioni sono state selezionate sulla base della loro importanza per la nidificazione, lo svernamento, gli erratismi, la curiosità o l'interesse locale. Sono stati raccolti e analizzati alcune migliaia di dati riferiti a 146 specie diverse di uccelli.

Tra le segnalazioni più interessanti rilevate nel corso del 2013 si ricordano la conferma dello svernamento di un numero importante di zigoli delle nevi e di fringuelli alpini; i nuovi dati di presenza di marzaiola, airone guardabuoi, cicogna nera, re di quaglie, gru, civetta nana, gufo di palude, gruccione, grillaio, canapino maggiore, beccofrusone, venturone e ortolano; le osservazioni di tuffetto, taccola e monachella, specie mai segnalate nei precedenti resoconti. Alle specie ricordate in questi ultimi otto anni vanno aggiunti il piccione di città e un lanario osservato a Finetti, Tregnago, nel luglio 2010 (Sighele *et al.*, 2011), che portano il numero complessivo dei *taxa* a 175. La tassonomia segue le indicazioni di Sangster *et al.* (2010-2015).

Buona parte delle segnalazioni proviene dalla rete dell'associazione Verona Birdwatching. Altre informazioni sono state raccolte dal personale del Servizio Guardiaparco, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento, dei Corpi di Polizia Provinciale di Verona e Vicenza e di Veneto Agricoltura durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio. Alcune segnalazioni sono pervenute anche da appassionati, escursionisti, fotonaturalisti e residenti.

Tutte le immagini sono state riprese in Lessinia nel corso del 2013. La copertina di quest'anno è dedicata al beccofrusone, sporadico visitatore del Parco.

Hanno contribuito alla stesura di questa pubblicazione: *Mick Allen, Silvano Aprili, Maurizio Azzolini, Anna Bandieri, Claudio Bandieri, Nicola Baruffaldi, Stefania Barugola, Domenico Benciolini, Leonardo Bergamini, Sergio Bergamini, Domenico Bernasconi, Paolo Bertini, Marco Boccafoli, Tommaso Borghetti, Rosalba Boscaini, Paolo Boschi, Michele Bottazzo, Pierangelo Canali, Chiara Castagna, Ernesto Cavallini, Carla Chiappisi, Ivo Cipriani, Maurizio Cordioli, Bruno Corradi, Gaudino Corradi, Valentina Corradi, Micaela Cristofoletti, Massimo D'Agostino, Piero Dal Dosso, Giangaetano Dalle Vedove, Davide De Biasi, Mauro D'offria, Elena Facchini, Massimo Faccioli, Igino Falco, Vittorio Fanelli, Andrea Felicetti, Eugenio Fella, Enza Grippo, Claudio Isotta, Cristiano Izzo, Alessandro Leso, Gianbattista Leso, Roberto Lerco, Maurizio Lezzi, Luca Longo, Carlo Marcolini, Luca Mazzola, Marco Melotti, Ugo Monicelli, Paolo Panarotto, Paolo Parricelli, Fabio Pegoraro, Gianluca Perlato, Daniele Peterlini, Marco Peterlini, Roberto Pistollato, Anna Pigozzo, Giorgio Rigo, Andrea Saorin, Elio Sauro, Leopoldo Scandola, Greta Serafin, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Luca Signori, Dorino Stocchero, Massimo Tassinari, Sandro Tinazzi, Aldo Tonelli, Emanuele Tonolli, Alberto Turri, Fulvio Valbusa, Francesco Vaona, Tomas Vaona, Emanuele Vendramin, Roberta Vignola, Corrado Zanini, Roberto Zorzin*.

Le osservazioni più interessanti del 2013

Alzavola ***Anas crecca***

Anatra di superficie segnalata irregolarmente nel Parco durante la migrazione post-riproduttiva tra la fine di agosto e i primi di novembre (Sighele & Parricelli, 2009, 2011, 2013).

2 indd. a Conca dei Parpari tra il 3 e il 5.09 (C. Izzo, P. Parricelli);

2 indd. a Podestaria il 27.10 (I. Cipriani).

Germano reale ***Anas platyrhynchos***

Anche quest'anatra piuttosto comune è osservata in Lessinia perlopiù nel periodo post-riproduttivo (Sighele & Parricelli, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013).

5 indd. nel Vajo della Marciora l'1.08 (C. Isotta).

Marzaiola ***Anas querquedula***

Anatra migratrice che giunge in Italia alla fine dell'inverno per riprodursi; è stata segnalata in Lessinia una sola volta in precedenza, nel marzo 2012 (Sighele & Parricelli, 2013).

1 ind. a Roccopiano alla fine di settembre (F. Valbusa, D. Benciolini, A. Saorin).

Coturnice ***Alectoris graeca***

Galliforme piuttosto raro e localizzato, è segnalato perlopiù nel settore nord-orientale del Parco.

2-3 indd. tra Malera di Sopra e Pigarolo contattati più volte da maggio a settembre (P. Parricelli, G. Serafin, L. Signori);

1 ind. al Pigarolo il 20.11 (F. Valbusa).

Francolino di monte ***Tetrastes bonasia***

Specie rara e localizzata segnalata esclusivamente nella Foresta di Giazza e nella Lessinia trentina nei pressi di Castelberto.

1 ind. tra Rifugio Revolto e Lago Secco il 12.11 (P. Parricelli).

Fagiano di monte ***Tetrao tetrix***

Tetraonide presente perlopiù nel settore nord-orientale del Parco, si osserva più frequentemente nel periodo delle parate primaverili. Nei censimenti primaverili nelle arene di canto abitualmente censite, tra il 17.05 e il 5.06, sono stati conteggiati 19 indd. (13 mm. e 6 ff.):

3 mm. e 2 ff. a Campobrun di Ala (TN), 3 mm. al Valon, 7 mm. e 4 ff. in Val Fraselle - Molesse - Passo Lora, (P. Parricelli, L. Signori, M. Bottazzo, G. Serafin, P. Dal Dosso, P. Boschi *et al.*).

Nei censimenti tardo estivi:

15 indd. tra il Valon e Cima Trappola - Bella Lasta il 31.08 e il 7.09: 1 f. con 4 juvv., 1 f. con 1 juv., 1 f. con 1 juv., 1 juv., 2 ff. senza covata, 3 mm. (P. Parricelli, F. Valbusa, A. Leso, A. Saorin, C. Castagna *et al.*);

12 indd. tra Passo Lora e l'alta Val Fraselle - Gramolon il 5.09: 1 f. con 4 juvv., 1 f. con 3 juvv., 3 mm. (D. Stocchero, F. Pegoraro *et al.*); 1 ind. segnalato in alta Val Fraselle in precedenza anche il 25.08 (R. Lerco, V. Fanelli, C. Zanini).

Gallo cedrone ***Tetrao urogallus***

Specie rara e localizzata nelle aree boscate più mature e tranquille della porzione centro-orientale del Parco. Nel 2013 per la prima volta è stata data concreta applicazione al Regolamento del Parco n. 1/2009 con l'obbligo di posticipare un'utilizzazione forestale coincidente con il delicato periodo della fase riproduttiva.

1 m. e 1 f. a Le Gosse tra aprile e giugno (L. Signori, G. Perlato, P. Parricelli, F. Valbusa); nella stessa area è stato rinvenuto un nido con 5 uova schiuse il 18.08 (C. Marcolini);

1 f. con 3-4 juvv. a Camporotondo di Sotto il 24.07 (L. Scandola);

escrementi sono stati ritrovati a Lago Boaro il 29.10 (P. Parricelli, F. Valbusa, D. Benciolini, A. Leso).

Cormorano ***Phalacrocorax carbo***

Uccello acquatico osservato nuovamente in Lessinia nel mese di marzo durante il transito migratorio primaverile, in volo verso i territori di riproduzione.

9 indd. in volo sopra Bocca di Selva e 5 indd. sopra Maregge il 5.03 (M. Melotti, F. Valbusa).

Airone guardabuoi ***Bubulcus ibis***

Nuova segnalazione per questo piccolo ardeide di cui si ha notizia in Lessinia solamente dal dicembre del 2011 (Sighele & Parricelli, 2012).

7 indd. a Santissima Trinità nella prima decade di dicembre (G. Leso);

5 indd. a San Rocco di Piegara il 14.12 (R. Lerco).

Airone cenerino ***Ardea cinerea***

Questo ardeide è diventato negli anni sempre più comune in Lessinia anche in quota, in prossimità delle pozze d'alpeggio; nel 2013 è stato osservato in diversi siti dell'altipiano almeno tra aprile e novembre.

Cicogna nera ***Ciconia nigra***

Specie piuttosto scarsa in provincia di Verona, segnalata nei due passi migratori, in particolare in quello post-riproduttivo. È stata osservata irregolarmente anche in Lessinia, ma solamente in questi ultimi anni (Sighele & Parricelli, 2008, 2011, 2012).

8 indd. in alta Val Fraselle il 30.08 (L. Longo).

Tuffetto ***Tachybaptus ruficollis***

Prima segnalazione nota in Lessinia per questo uccello tipico delle zone umide, anche di quelle più piccole come canali, fossi o stagni.

1 ind. a Spiazzoi il 3.08 (C. Izzo, M. Allen).

Falco pecchiaiolo ***Pernis apivorus***

Rapace migratore abbastanza comune e nidificante nel Parco con qualche coppia, più frequente nelle aree boscate a quote poco elevate. In alta Lessinia non sono mai stati trovati importanti punti di osservazione per i censimenti della migrazione post-riproduttiva, che invece è con successo monitorata sulle colline moreniche a sud del Lago di Garda e, in minor misura, nella zona collinare subito a nord di Verona. Nel 2013 è stato osservato tra il 25.05 e l'8.09.

Nibbio bruno ***Milvus migrans***

Analogamente al precedente è un rapace migratore segnalato in periodo riproduttivo con regolarità in Lessinia, tra l'inizio di aprile e la fine di agosto. Nel 2013 è stato osservato tra l'1.04 e il 21.08, soprattutto lungo i versanti boscati prospicienti la Val d'Adige o in sorvolo a bassa quota in cerca di prede sugli alti pascoli.

Nibbio reale ***Milvus milvus***

Visitatore piuttosto sporadico del Parco della Lessinia, segnalato in precedenza solo nel maggio 1997 e nell'ottobre 2012 (De Franceschi & Parricelli, 2002; Sighele & Parricelli, 2013).

1 ind. a Passo Fittanze il 16.08 (C. Isotta).

Biancone ***Circaetus gallicus***

Grande aquila migratrice di presenza regolare in Lessinia, dove nidifica probabilmente in modo regolare. Seppur con minore frequenza rispetto all'anno precedente, anche nel 2013, tra l'1.06 e il 5.09, il biancone è stato segnalato su tutto l'altipiano della Lessinia, nei comuni di Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Selva di Progno e Tregnago, così come Ala (TN). La segnalazione più interessante:

3 indd. sopra Malga Vallina il 3.08 (E. Tonolli).

Biancone a Malga Vallina - *Emanuele Tonolli*

Albanella minore in Val Squaranto - ***Carla Chiappisi***

Falco di palude ***Circus aeruginosus***

Rapace in passato poco noto in Lessinia (De Franceschi & Parricelli, 2002), è invece segnalato con regolarità durante le migrazioni, in particolare nel mese di settembre, anche se poco numeroso (Sighele & Parricelli, 2007, 2008, 2010-2013).

1 ind. a Malga Braetta il 27.08 (C. & A. Bandieri, E. Facchini);
1 ind. in alta Val Fraselle il 7.09 (C. Zanini *et al.*);
1 ind. a Castelberto il 29.09 (C. Izzo).

Albanella reale ***Circus cyaneus***

Come la precedente anche questa specie visita regolarmente il Parco, seppur scarsa, segnalata perlopiù durante i passi migratori.

1 ind. ai Parpari il 26.10 (C. Izzo).

Albanella minore ***Circus pygargus***

Rapace migratore di lungo raggio che sverna in Africa, rispetto alle congeneri questa albanella in Lessinia sembra essere più irregolare, ma per il terzo anno consecutivo è stata osservata nel mese di maggio.

1 ind. in Val Squaranto il 18.05 (C. Izzo, C. Chiappisi);
1 ind. a Campofontana il 26.05 (V. Fanelli, C. Izzo).

Astore ***Accipiter gentilis***

Rapace ritenuto fino a qualche tempo fa piuttosto scarso in Lessinia (De Franceschi & Parricelli, 2002), in realtà negli anni si è dimostrato abbastanza diffuso; le segnalazioni, quasi sempre di singoli individui perlopiù tra aprile e ottobre, provengono da Vallene, Scandole, Maregge, Merli, Parpari, ma il sito dove sembra più facile osservare questa specie è quello del Ponte dell'Anguillara. Inoltre:

1 ind. nei pressi di Rosaro il 30.01 (C. Isotta);
1 ind. a nord di San Rocco di Piegara il 23.02 (R. Lerco);
1 ind. a Rosaro il 17 e il 18.06 in caccia di merli e tortore dal collare (C. Isotta);
1 ind. disturbato da un corvo imperiale a Castelberto il 21.09 (C. Chiappisi, P. Bertini).

Aquila reale ***Aquila chrysaetos***

A partire dal 1995 è nota la presenza di una coppia territoriale che si riproduce pressoché regolarmente nei quattro siti di nidificazione approntati nell'area di Giazza (De Franceschi & Parricelli, 2002). Anche nel 2013 è stata accertata l'avvenuta riproduzione con ripetuti avvistamenti nell'area di un giovane dell'anno a partire dalla terza decade di agosto (P. Parricelli, L. Signori, G. Perlato). L'altipiano è inoltre irregolarmente frequentato per motivi trofici da individui provenienti dai massicci montuosi limitrofi e da altri esemplari non territoriali. Non è infine da escludere la presenza di una seconda coppia nidificante nell'area più occidentale del Parco. Di seguito si elencano gli avvistamenti più interessanti:

3 indd. a Bocca di Selva il 10.03 (M. Samaritani);
1 subad. a San Giorgio e 1 diverso subad. a Malga Vallina di Sopra il 4.05 (C. Izzo, M. Allen).
2 indd. al Ponte dell'Anguillara il 5.05 (V. Fanelli, E. Grippo);
1 subad. al Branchetto, 3 add. e 1 subad. a Castelberto il 12.05 (M. & G. Sighele, R. Lerco, C. Izzo, R. Vignola);
2 indd. a Castelberto il 18.05 (L. Mazzola);
1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 16.05, il 26.05 e il 20.06 (V. Fanelli, C. Izzo, G. Dalle Vedove);
1 subad. a Malga Lago Boaro ai primi di giugno, fortuitamente ripreso con fototrappola mentre si alimentava sulla carcassa di un vitello predato da lupo (Parco della Lessinia, CFS Bosco Chiesanuova);
1 ind. a Vallene e 1 ind. al Pigarolo il 6.07 (M. Sighele);
1 subad. inseguito da circa 50 cornacchie grigie il 10.08 tra Podestaria e Castelberto (C. Isotta);
2 indd. a Passo Mesole (VI) l'11.08 (P. Parricelli);
2 indd. a San Giorgio l'1.11 (M. D'offria).

Aquila reale - ***Luca Signori***

Re di quaglie ***Crex crex***

Specie elusiva di presenza sporadica in Lessinia, è usualmente contattata per il caratteristico canto emesso perlopiù nelle ore notturne.

1 ind. in canto a Campofontana il 26.06 (M. Bertacco);
2-3 indd. ad Azzarino, Velo V.se, tra giugno e agosto (B. Corradi, M. D'Agostino).

Gru ***Grus grus***

Nuove segnalazioni in Lessinia di questa specie migratrice, uno dei più grandi uccelli europei.

300 indd. ca. sopra Bosco Chiesanuova il 31.03 (F. Valbusa, S. Tinazzi);
alcuni indd. sopra Chiampo (VI) il 3.12 (M. Bertacco).

Piro piro culbianco ***Tringa ochropus***

Segnalato in Lessinia per la prima volta solamente nel 2007, da allora è stato segnalato quasi ogni anno, in sosta presso le pozze d'alpeggio durante il passo migratorio, perlopiù nel mese di agosto (Sighele & Parricelli, 2008, 2009, 2012, 2013).

1 ind. a Malga Campegno il 27.07 (P. Parricelli);
1 ind. a San Giorgio il 5.08 (P. Bertini);
1 ind. nei pressi di Malga Porcarina il 6.08 (C. Isotta);
1 ind. nei pressi di Passo Fittanze l'8.08 (C. Isotta);
2 indd. a ovest di Campolevà il 24.08 (C. Izzo);
2 indd. a Conca dei Parpari il 4.09 (C. Izzo, P. Parricelli).

Pettegola ***Tringa totanus***

Di questo limicolo si conosce una sola precedente segnalazione in Lessinia, che risale al settembre 2010 (Sighele & Parricelli, 2011).

1 ind. a Malga Modo il 17.05 (L. Mazzola);
1 ind. al Baito dei Pastori il 29.05 (P. Parricelli).

Beccaccino ***Gallinago gallinago***

Questo limicolo è irregolarmente segnalato in Lessinia nei periodi dei passi migratori, in particolare in quello post-riproduttivo (Sighele & Parricelli, 2008, 2012, 2013).

1 ind. a Malga Roccopiano tra il 5 e il 7.08 (C. Isotta, P. Parricelli);
1 ind. a sud di San Giorgio il 24.08 (C. Izzo);
1 ind. a Dosso Alto il 21.09 (C. Izzo, C. Zanini).

Tortora dal collare ***Streptopelia decaocto***

Columbiforme segnalato in Lessinia solo negli ultimi anni. Anche le osservazioni del 2013 paiono confermare l'ampliamento dell'areale distributivo della specie dalle aree di pianura alla zona pedemontana.

3 indd. a Lugo il 9.03 (P. Parricelli);
1 ind. poco a nord di Bernardi, Selva di Progno, il 7.04 (M. Sighele, R. Vignola).
2-3 indd. a Badia Calavena il 25.05 (M. Sighele).

Assiolo ***Otus scops***

Piccolo strigiforme migratore, in Lessinia qualche coppia si riproduce regolarmente almeno da qualche anno (Sighele & Parricelli, 2009-2011).

1 ind. in canto nel mese di aprile in contrada Villa, Erbezzo, dove la specie è stata osservata anche nei 4-5 anni precedenti (L. Mazzola);

1 ind. recuperato ferito a Sega di Ala (TN), 1250 m slm, il 29.06 (T. Borghetti, D. De Biasi);

1 cp. ha nidificato su un ciliegio a Breonio (E. Vendramin);

1 ind. in canto a Valle di Velo V.se il 7.08 (S. Aprili).

Gufo reale ***Bubo bubo***

Nel 2013 è stata confermata la presenza di questo imponente strigide in due siti ormai consolidati, a Molina e in alta Valpantena (C. Zanini, R. Lerco, V. Fanelli, C. Izzo *et al.*).

Civetta nana ***Glaucidium passerinum***

Piccolo rapace notturno raro ed elusivo, è segnalato di rado nelle aree boscate più mature del settore centro-orientale del Parco; di recente è stato contattato solamente nel novembre 2012 (Sighele & Parricelli, 2013).

1 ind. nella Foresta dei Folignani il 30.01 (P. Parricelli, G. Serafin).

Gufo comune ***Asio otus***

In Lessinia questa specie era storicamente considerata piuttosto comune e nidificante (Arrigoni degli Oddi, 1899), in seguito ritenuta rarissima (Benetti, 1981), è stata regolarmente segnalata nei sette anni precedenti (Sighele & Parricelli, 2007-2013).

3 juvv. a Grietz tra fine luglio e il 9.08 (M. & D. Peterlini).

Gufo di palude ***Asio flammeus***

Questo strigiforme è sporadicamente presente in provincia di Verona durante i passi migratori e capita talora anche in Lessinia (Sighele & Parricelli, 2010, 2011, 2013).

1 ind. a Malga Tommasona il 13.04 (M. & D. Peterlini).

Civetta capogrosso ***Aegolius funereus***

Strigiforme strettamente notturno, legato alle foreste mature di conifere e faggio. Difficile da osservare, tradisce la sua presenza con il caratteristico e monotono canto emesso perlopiù tra fine inverno e inizio primavera.

1 ind. alla Bocchetta della Vallina il 4.05 (C. Izzo);

1 ind. nel Vajo dell'Anguilla il 27.05 (G. Dalle Vedove *et al.*).

Succiacapre ***Caprimulgus europaeus***

Specie migratrice visitatrice estiva del Parco della Lessinia, è contattata grazie al tipico canto emesso nelle ore notturne, quando è attiva.

alcune cpp. nidificanti sul Monte Solane, con pulli al nido osservati a partire dal 7.07 (E. Grippo, V. Fanelli *et al.*).

Gufo di palude a Malga Tommasona - *Marco & Daniele Peterlini*

Rondone maggiore ***Apus melba***

Rondone abbastanza comune, segnalato regolarmente nel Parco durante il periodo della nidificazione e dei passi migratori; si ricorda una segnalazione piuttosto tardiva:

3 indd. a Castelberto il 7.10 (L. Mazzola).

Upupa ***Upupa epops***

Specie appariscente piuttosto numerosa nei passi migratori, in Lessinia è poco comune la sua nidificazione, pertanto si elencano le segnalazioni riferibili al periodo riproduttivo:

1-2 indd. a Malga Masetto tra aprile e giugno (P. Parricelli, G. Serafin);
1 ind. a Bosco Chiesanuova il 15.06 (C. Isotta);
1 ind. in contrada Tezza il 18.06 (C. Bandieri).

Gruccione ***Merops apiaster***

Nuove segnalazioni in Lessinia di questa colorata specie migratrice dopo quelle nell'agosto del 2011 e del 2012 (Sighele & Parricelli, 2012, 2013):

1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 26.05 (V. Fanelli, C. Izzo);
25-30 indd. sul Monte Tregnago il 10 e l'11.08 (C. Isotta);
25-30 indd. in volo sopra San Giorgio il 12.08 (C. Isotta);
5 indd. nella Valle delle Sfingi il 4.09 (G. Rigo).

Torcicollo ***Jynx torquilla***

Picide migratore presente nel Parco con regolarità durante i due passi, più raro nel periodo riproduttivo:

1 ind. a Velo V.se il 26.05 (M. Sighele);
1 ind. a San Giorgio il 22.06 (C. & A. Bandieri, E. Facchini).
1 ind. a Fosse il 6.07 (M. Sighele, M. Allen).

Picchio nero ***Dryocopus martius***

Picchio di grandi dimensioni tipico dei boschi maturi, in Lessinia è frequente e numeroso nella Foresta di Giazza, così come nell'alto Vajo dell'Anguilla. Al di fuori dei siti più usuali:

1 ind. sul Monte Solane, 600 m slm, il 14.04 (M. Sighele);
1 ind. nell'alto Vajo dei Falconi l'8.09 (C. Isotta);
1 ind. a Selva di Progno l'11.12 (L. Signori).

Grillaio ***Falco naumanni***

Falchetto ritenuto assai raro in provincia di Verona, dopo le osservazioni del 2012 (Sighele & Parricelli, 2013) è stata avviata una ricerca mirata per questa specie in Lessinia centro-orientale. Il grillaio di recente era stato osservato in provincia nella prima metà degli anni 90 del XX secolo sul Monte Baldo (De Franceschi & Parricelli, 2002), mentre in Lessinia era noto solo per dati storici (Arrigoni degli Oddi, 1899).

1-3 indd. a Santa Viola, Grezzana, tra il 4 e il 6.09 (M. D'offria);

Grillaio a Cancello - *Roberto Lerco*

2-10 indd. tra Cancello e Trezzolano, Verona, tra il 21.08 e il 9.09 (R. Lerco, C. Zanini, C. Izzo, M. D'offria *et al.*).

Falco cuculo ***Falco vespertinus***

Falco osservato frequentemente in Lessinia durante i due passi migratori, ma solitamente più scarso in periodo post-riproduttivo per via delle diverse rotte di transito.

1 ind. ai Parpari il 27.04 (G. Perlato);
1 ind. a Centro di Tregnago l'8.05 (C. Zanini);
1-4 indd. a Santa Viola, Grezzana, tra il 3 e il 6.09 (M. D'offria);
1 ind. a Dosso Alto marcato con anello ungherese il 5.09; lo stesso giorno 1 ind. a Castelberto e 2 indd. a Cancello, Verona (C. Izzo).

Smeriglio ***Falco columbarius***

Piccolo falco presente in Italia al di fuori del periodo riproduttivo. Si osserva quasi regolarmente anche nel Parco, perlopiù nei passi migratori, di rado nei mesi invernali.

1 ind. a Santa Viola, Grezzana, il 30.10 (M. D'offria).

Falco cuculo con anello ungherese a Dosso Alto - *Cristiano Izzo*

Lodolaio ***Falco subbuteo***

Falco presente in provincia di Verona nei passi migratori e come nidificante. Non era nota la sua presenza in Lessinia fino al 2007, ma da allora è sempre stato segnalato con osservazioni sempre più numerose anche in periodo riproduttivo (Sighele & Parricelli, 2008-2013).

Lodolaio - ***Sergio Rima***

1 ind. ai Parpari il 24.04 (S. Rima);
1 ind. a Cava Belloca, Tregnago, il 14.05, l'8.06 e l'1.07 (C. Zanini, V. Fanelli, C. Izzo, C. Chiappisi, G. Dalle Vedove);
1 ind. disturbato da uno sparviere al Ponte dell'Anguillara il 4.08 (C. Izzo);
1 ind. a Campolevà il 6.08 in caccia di codirossoni, ballerine bianche e rondini (C. Isotta);
1 ind. a Branchetto il 6.08 (C. Isotta);
2 indd. a Roncà il 6.08 (E. Cavallini);
1 ind. verso il Forte Masua il 10.08 (G. Dalle Vedove);
1 ind. a Grietz il 22.08 (P. Parricelli);
1 ind. a San Giorgio il 24.08 (C. Isotta);
2-3 indd. sul Monte Tomba il 29.08 (C. & A. Bandieri, E. Facchini);
1 ind. al Ponte dell'Anguillara il 4.09 (C. Izzo).

Falco pellegrino ***Falco peregrinus***

Falcone tipicamente rupicolo dall'aspetto robusto e silhouette di volo caratteristica; eccezionale predatore, cattura uccelli in volo con rapide e vertiginose picchiate. Dopo un periodo di rarefazione, negli ultimi decenni la specie pare in netta ripresa. In Lessinia è relativamente facile da contattare nelle aree con ripide pareti rocciose ricche di cavità utilizzabili per la nidificazione. Si riportano solo alcune particolari segnalazioni:

1 ind. con uccello predato tra gli artigli nei pressi di Lugo il 9.03 (P. Parricelli);
2 indd. disturbati da gheppi nel Valon del Malera il 31.07 (C. Isotta);
1 ind. a caccia di tordele a Passo Fittanze il 16.08 (C. Isotta);
1 ind. a caccia di gracchi alpini ai Parpari il 31.10 (G. Sighele, C. Izzo).

Averla maggiore ***Lanius excubitor***

Pochi individui di questa grande averla, che nidifica in Europa centro-settentrionale, vengono costantemente contattati in Lessinia durante il periodo invernale.

1 ind. nei pressi di Scandole il 16.02 (R. Lerco);
1 ind. a Passo Fittanze l'1.11 (F. & T. Vaona);
1 ind. a Malga Roste il 13.11 (E. Cavallini);
1 ind. a San Rocco di Piegara il 17.11. e l'8.12 (C. Izzo).

Gazza ***Pica pica***

Corvide assai comune e diffuso in pianura, aumentano le segnalazioni nel Parco, dove la sua presenza è nota solo da qualche anno (Sighele & Parricelli, 2007, 2011, 2012).

1 ind. a Campofontana il 12.01 (P. Panarotto);

1 ind. nei pressi di Roncari-Tebaldi il 27.01 (P. Panarotto);
1 ind. a Praole il 14.04 (M. & D. Peterlini);
1 ind. a Fosse l'1.07 (G. Dalle Vedove);
2 indd. a Chiusa di Bosco Chiesanuova il 30.11 (E. Sauro).

Taccola ***Corvus monedula***

Prime segnalazioni note per il Parco della Lessinia di questo corvide, che nella nostra provincia frequenta prevalentemente centri urbani di pianura.

1 ind. a Erbezzo il 18.05 (C. Izzo).
15 indd. a Dosso Alto il 21.09 (C. Izzo, C. Zanini).

Cornacchia nera ***Corvus corone***

Corvide poco numeroso, solitamente più frequente in periodo invernale.

2 indd. a Cavagile il 6.01 (M. Sighele);
1 ind. a Rosaro il 5 e il 15.02 (P. Parricelli, C. Isotta);
1 ind. sul Monte Loffa il 17.02 e poi ancora il 2.06 (V. Fanelli, M. Sighele);
1 ind. a Selva di Progno il 21.03 (P. Parricelli, L. Signori);
1 ind. a Campolevà il 4.05 (C. Izzo, M. Allen);
2 indd. a Cava Belloca, Tregnago, l'8.06 (V. Fanelli, C. Izzo, C. Chiappisi);
1 ind. a Ca' del Diavolo tra il 17 e il 24.08 (G. Dalle Vedove, R. Lerco, V. Fanelli);
1 ind. in loc. la Cona e 2 indd. a Rosaro il 25.11 (C. Isotta).

Corvo imperiale ***Corvus corax***

Il più grande tra i corvidi italiani, nel Parco della Lessinia è abbastanza diffuso e nidificante, ma decisamente meno abbondante rispetto a cornacchia grigia e gracchio alpino; si elencano le concentrazioni più rilevanti:

13 indd. sul Monte Solane il 14.07 (M. & G. Sighele, V. Fanelli, E. Grippo);
44 indd. in alta Val Fraselle il 30.08 (L. Longo);
13 indd. a Castelteberto il 21.09 (C. Zanini, C. Izzo, P. Bertini, C. Chiappisi).

Sterpazzola ***Sylvia communis***

Silvide migratore transahariano presente in provincia di Verona come nidificante abbastanza diffuso in pianura. Le prime segnalazioni nel Parco della Lessinia risalgono almeno al 2009 e da allora la specie sembra essersi ben adattata a quote tra i 1200 e i 1700 m (Sighele & Parricelli, 2010-2013). Le osservazioni del 2013 sono giunte in particolare dalla zona di San Giorgio, dove la sterpazzola si è confermata nidificante piuttosto diffusa, presente tra il 5.05 e il 5.09 (C. Izzo, M. Sighele *et al.*).

Canapino maggiore ***Hippolais icterina***

Passeriforme migratore osservato in Italia solo durante i due passi migratori; in Lessinia è piuttosto raro o per lo meno è poco rilevato, infatti è stato segnalato in precedenza solo nell'agosto 2011 (Sighele & Parricelli, 2012).

4 indd. a Sauro il 2.08 (C. Isotta).

Beccofrusoni nei pressi di Camposilvano - *Valentina Corradi*

Beccofrusone ***Bombycilla garrulus***

Specie vistosa e confidente diffusa nella Scandinavia e nel nord della Russia. La Lessinia è talvolta interessata da presenze invernali associate alle cicliche irruzioni caratteristiche della specie. L'inverno 2012-2013 ha fatto registrare lo svernamento di un consistente numero di individui.

15-24 indd. osservati lungo il confine provinciale tra Malga Lavacchietto di Ala (TN), Coe Veronesi e Castelberto, tra il 18.12.2012 e la prima decade di gennaio (T. Borghetti, A. Felicetti *et al.*);
1 ind. a Campofontana il 6.01 (P. Panarotto);
150 indd. ca. nei pressi di Camposilvano tra il 2.01 e il 10.04 (B. & V. Corradi, P. Parricelli, G. Serafin, L. Signori, F. Valbusa, G. Perlato, A. Pigozzo, C. Chiappisi, R. Lerco, P. Panarotto, M. Boccafoli, R. Boscaini *et al.*);
4 indd. a Grietz l'11.01 e il 16.01 (E. Sauro, P. Parricelli, G. Serafin *et al.*);
1 ind. poco a nord di Roncà il 17.01 (D. Stocchero, G. De Grati);
10 indd. a Tecchie, Velo V.se, il 19.01 (R. Zorzin), alcuni sino al 17.04 (G. Corradi);
30 indd. ai Parpari il 13.02 (M. D'offria);
4 indd. a Finco il 5.03 (P. Panarotto).

Picchio muraiolo ***Tichodroma muraria***

Caratteristica e inconfondibile specie strettamente legata alle pareti rocciose. Solo pochi individui sono regolarmente contattati nella Lessinia veronese, perlopiù in periodo invernale.

almeno 1 ind. alla Torre del Falasco tra novembre 2012 e il 4.01 (I. Falco, C. Izzo, M. Allen, E. Fella, C. Chiappisi *et al.*);
1 ind. a Maregge il 12.04 (M. Tassinari);
1 ind. a Passo Pertica (TN) il 13.12 (L. Signori);
1 ind. ai Merli il 29.12 (A. Turri).

Storno ***Sturnus vulgaris***

Passeriforme assai comune e diffuso, in Lessinia è piuttosto localizzato. Si ricorda una interessante concentrazione in quota:

120 indd. ai Parpari il 6.10 (M. D'offria).

Merlo acquaiolo ***Cinclus cinclus***

Specie poco comune e localizzata per la scarsità di corsi d'acqua perenni in Lessinia. Anche nel 2013 qualche coppia, talvolta accompagnata da juvv., è stata ripetutamente contattata negli usuali siti di presenza della Valle di Fumane, Vajo della Marciora, alta Val d'Alpone, Giazza e Val Fraselle, alta Val del Chiampo.

Merlo dal collare ***Turdus torquatus***

Passeriforme migratore che si riproduce nella zona degli arbusti contorti fino al limite della vegetazione arborea, comune ma localizzato all'interno del Parco. Segnalato nel Valon e in alta Val Fraselle tra maggio e il 7.09, con presenza di pulli già dall'1.06 (M. Sighele, R. Lerco, M. D'offria, C. Zanini, C. Isotta *et al.*).

Cesena ***Turdus pilaris***

Specie fortemente gregaria e molto vocifera, qualche coppia nidifica irregolarmente nelle aree boscate dell'altipiano. Le presenze più consistenti si registrano durante il passo autunnale e l'inizio dell'inverno, in annate con abbondante fruttificazione di sorbo degli uccellatori. Si segnalano i raggruppamenti più numerosi:

150 indd. a Malga Bosco il 30.11 (P. Parricelli):

250-300 indd. tra i Parpari e Spiazzoi il 6.12 (C. Izzo).

Codirossone ***Monticola saxatilis***

Turdide migratore poco comune e localizzato, alcune coppie nidificano regolarmente nei pascoli d'altitudine con rada vegetazione e cospicua presenza di rocce.

almeno 1 cp. ha certamente nidificato a Branchetto, con prime segnalazioni dal 27.05, giovani da poco involati il 25.07, osservati in seguito fino all'1.09 (G. Dalle Vedove, E. Cavallini, D. Bernasconi, C. Bandieri *et al.*);

almeno 1 cp. ha nidificato nella zona di San Giorgio, con prime osservazioni a partire dal 5.05, adulti con imbeccata dal 22.06, segnalazioni successive fino al 21.08 (M. Sighele, C. Zanini, R. Lerco, C. Izzo *et al.*); 1 ind. osservato il 29.06 era marcato con anello metallico che non è stato possibile leggere (E. Tonolli);

1 cp. ripetutamente contattata sul Monte Grolla tra maggio e agosto (L. Signori, P. Parricelli);

1 m. osservato più volte tra Gaibana e San Nazaro a partire dal mese di maggio (P. Parricelli).

Monachella ***Oenanthe hispanica***

Questo passeriforme all'inizio del '900 era considerato un migratore nidificante scarso e localizzato nei prati aridi della Lessinia, in particolare nella zona di Breonio, con una singola cattura per la ssp. orientale *melanoleuca* (Arrigoni degli Oddi, 1899). Successivamente questa specie è stata esclusa dai nidificanti

Sordone a San Giorgio - ***Micaela Cristofoletti***

provinciali fino alla fine del XX secolo, quando a Monte di Fumane sono stati sporadicamente osservati maschi con imbeccata o in canto, l'ultima volta nel giugno 2002 (De Franceschi *et al.*, 2004).

1 m. ssp. *melanoleuca* della forma a gola nera tra le cave di estrazione nei pressi di Fosse tra l'1.06 e l'1.07 (E. Grippo, V. Fanelli, M. & G. Sighele e*t al.*).

Sordone ***Prunella collaris***

Specie poco numerosa contattata esclusivamente in periodo invernale, gli individui avvistati provengono verosimilmente dai limitrofi massicci montuosi del Carega e del Baldo.

1-4 indd. a Bocca di Selva tra dicembre 2012 e il 10.02 (P. Bertini *et al.*).
1-5 indd. a San Giorgio tra dicembre 2012 e l'8.04 (M. Sighele, A. Pigozzo, C. Izzo, R. Lerco, M. Cristofoletti, L. & S. Bergamini, P. Parricelli *et al.*);
1-3 indd. a Castelberto tra il 9 e il 13.01 (L. Mazzola *et al.*);
10 indd. al Pigarolo il 10 e il 13.01 (P. Parricelli);
3 indd. a Malga Lessinia l'11.01 (P. Parricelli);
1 ind. nei pressi di Roncari-Tebaldi il 27.01 (P. Panarotto);
4 indd. sul Corno d'Aquilio in aprile (P. Parricelli).

L'inverno successivo:

1 ind. a San Giorgio il 14.12 (R. Lerco).

Fringuello alpino ***Montifringilla nivalis***

Passeriforme d'alta quota, come il sordone giunge in Lessinia nei mesi invernali compiendo brevi erratismi altitudinali in caso di consistente innevamento e temperature molto rigide.

30-50 indd. a Bocca di Selva tra gennaio e la prima decade di marzo, ma con conteggio massimo di 105 indd. il 10.02 (P. Parricelli, M. Sighele, R. Vignola, I. Falco, R. Lerco, P. Panarotto, A. Tonelli *et al.*);

Zigolo delle nevi e fringuello alpino a Bocca di Selva - ***Sergio Rima***

1 ind. a Malga Lessinia il 13.01 (L. Mazzola);
10 indd. a Velo V.se il 16.01 (P. Parricelli, G. Serafin);
15-50 indd. a San Giorgio tra il 3.02 e l'8.04 (M. D'offria, R. Lerco, P. Bertini, P. Panarotto, P. Parricelli *et al.*);
16 indd. ai Parpari l'8.04 (P. Parricelli).

Peppola ***Fringilla montifringilla***

Fringillide regolarmente avvistato nel corso della migrazione autunnale, talora sverna in concentrazioni assai numerose soprattutto presso i caratteristici dormitori. Si ricorda la concentrazione più importante, peraltro non particolarmente numerosa:

200 indd. ca. tra San Giorgio e i Parpari tra ottobre e dicembre (M. D'offria, C. Izzo, R. Lerco).

Fringuello ***Fringilla coelebs***

Fringillide assai comune e diffuso in Lessinia, presente sia in periodo invernale che come nidificante. Si ricorda solamente:

3.500 indd. ca. tra Tregnago, San Giovanni I.ne, Bolca, Giazza e Chiampo nella prima decade di marzo (P. Panarotto).

Frosone ***Coccothraustes coccothraustes***

È il più grande dei fringillidi europei, poco numeroso in Lessinia, viene contattato specialmente nel corso del transito migratorio autunnale o nei mesi invernali.

12 indd. a Vallene il 20.10 (V. Fanelli);
50 indd. ca. ai Parpari il 26.10 (M. D'offria).

Venturone ***Carduelis citrinella***

Fringillide di presenza assai irregolare in tutto il Veneto, poco noto in provincia di Verona a quote medio-alte dove qualche individuo arriva in periodo post-riproduttivo. In Lessinia era nota una sola segnalazione in questo secolo, nel dicembre 2010 (Sighele & Parricelli, 2011).

4 indd. nei pressi del Rifugio Malera il 21.08 (C. Isotta).

Zigolo delle nevi ***Plectrophenax nivalis***

Lo svernamento pressoché regolare di questo raro passeriforme artico in Lessinia è l'unico noto per l'intero arco alpino. Tra l'avifauna presente nel Parco lo zigolo delle nevi rappresenta senz'altro la specie che più di ogni altra ha favorito la promozione dell'area protetta convogliando nell'hotspot di Bocca di Selva un elevato numero di visitatori provenienti da ogni parte d'Italia.

2-12 indd. a Bocca di Selva tra il 3 e il 30.12.2012, quindi 19 indd. in gennaio, poi man mano in numero sempre meno cospicuo fino al 13.04, quando era ancora presente 1 ind. (M. D'offria, M. Sighele, P. Parricelli, V. Fanelli, C. Izzo, E. Tonolli, L. Mazzola, M. Melotti, G. Serafin, R. Boscaini, N. Baruffaldi *et al.*).

L'inverno successivo:

4 indd. il 28.11 a Bocca di Selva, quindi 15-30 indd. durante il mese di dicembre, in seguito ancor più numeroso nei primi mesi del 2014 (M. Melotti, R. Lerco, M. Samaritani, M. Cordioli, S. Barugola, P. Parricelli *et al.*).

Ortolano ***Emberiza hortulana***

Zigolo migratore presente in provincia di Verona come nidificante, ma quasi esclusivamente nella "bassa" veronese, sempre meno frequente in zona collinare e ancor meno in quota.

1 ind. a Malga Vallina di Sopra il 27.08 (C. & A. Bandieri, E. Facchini).

Ortolano a Malga Vallina di Sopra - ***Claudio Bandieri***

Specie segnalate in Lessinia nel 2013

Anseriformes
Anatidae
Alzavola *Anas crecca*
Germano reale *Anas platyrhynchos*
Marzaiola *Anas querquedula*

Galliformes
Phasianidae
Quaglia *Coturnix coturnix*
Coturnice *Alectoris graeca*
Francolino di monte *Tetrastes bonasia*
Fagiano di monte *Tetrao tetrix*
Gallo cedrone *Tetrao urogallus*
Fagiano comune *Phasianus colchicus*

Pelecaniformes
Phalacrocoracidae
Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Ciconiiformes
Ardeidae
Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*
Airone cenerino *Ardea cinerea*

Ciconiidae
Cicogna nera *Ciconia nigra*

Podicipediformes
Podicipedidae
Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*

Accipitriformes
Accipitridae
Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*
Nibbio bruno *Milvus migrans*
Nibbio reale *Milvus milvus*
Biancone *Circaetus gallicus*
Falco di palude *Circus aeruginosus*
Albanella reale *Circus cyaneus*
Albanella minore *Circus pygargus*
Astore *Accipiter gentilis*
Sparviere *Accipiter nisus*
Poiana *Buteo buteo*
Aquila reale *Aquila chrysaetos*

Gruiformes
Rallidae
Re di quaglie *Crex crex*
Gru *Grus grus*

Charadriiformes
Scolopacidae
Piro piro culbianco *Tringa ochropus*
Pettegola *Tringa totanus*
Beccaccia *Scolopax rusticola*
Beccaccino *Gallinago gallinago*

Columbiformes
Columbidae
Piccione di città *Columba livia*
Colombaccio *Columba palumbus*
Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*
Tortora selvatica *Streptopelia turtur*

Cuculiformes
Cuculidae
Cuculo *Cuculus canorus*

Strigiformes
Strigidae
Assiolo *Otus scops*
Gufo reale *Bubo bubo*
Civetta nana *Glaucidium passerinum*
Civetta *Athene noctua*
Allocco *Strix aluco*
Gufo comune *Asio otus*
Gufo di palude *Asio flammeus*
Civetta capogrosso *Aegolius funereus*

Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

Apodiformes
Apodidae
Rondone comune *Apus apus*
Rondone maggiore *Apus melba*

Bucerotiiformes
Upupidae
Upupa *Upupa epops*

Coraciiformes
Meropidae
Gruccione *Merops apiaster*

Piciformes
Picidae
Torcicollo *Jynx torquilla*
Picchio verde *Picus viridis*
Picchio nero *Dryocopus martius*
Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*

Picchio rosso maggiore - *Luca Signori*

Falconiformes
Falconidae
Grillaio *Falco naumanni*
Gheppio *Falco tinnunculus*
Falco cuculo *Falco vespertinus*
Smeriglio *Falco columbarius*
Lodolaio *Falco subbuteo*
Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Passeriformes
Laniidae
Averla piccola *Lanius collurio*
Averla maggiore *Lanius excubitor*

Corvidae
Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*
Gazza *Pica pica*
Ghiandaia *Garrulus glandarius*
Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*
Taccola *Corvus monedula*
Cornacchia nera *Corvus corone*
Cornacchia grigia *Corvus cornix*
Corvo imperiale *Corvus corax*

Regulidae
Regolo *Regulus regulus*
Fiorrancino *Regulus ignicapilla*

Paridae
Cinciarella *Cyanistes caeruleus*
Cinciallegra *Parus major*
Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*
Cincia mora *Periparus ater*
Cincia alpestre *Poecile montanus*
Cincia bigia *Poecile palustris*

Alaudidae
Tottavilla *Lullula arborea*
Allodola *Alauda arvensis*

Hirundinidae
Topino *Riparia riparia*
Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*
Rondine *Hirundo rustica*
Balestruccio *Delichon urbicum*

Aegithalidae
Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Phylloscopidae
Luì verde *Phylloscopus sibilatrix*
Luì piccolo *Phylloscopus collybita*
Luì grosso *Phylloscopus trochilus*

Codirossone - ***Roberto Lerco***

Sylviidae
Capinera *Sylvia atricapilla*
Beccafico *Sylvia borin*
Bigiarella *Sylvia curruca*
Sterpazzola *Sylvia communis*
Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

Acrocephalidae
Canapino maggiore *Hippolais icterina*
Canapino comune *Hippolais polyglotta*

Bombycillidae
Beccofrusone *Bombycilla garrulus*

Tichodromidae
Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

Sittidae
Picchio muratore *Sitta europaea*

Certhiidae
Rampichino alpestre *Certhia familiaris*
Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

Troglodytidae
Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

Sturnidae
Storno *Sturnus vulgaris*

Cinclidae
Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Muscicapidae
Merlo dal collare *Turdus torquatus*
Merlo *Turdus merula*
Cesena *Turdus pilaris*
Tordo bottaccio *Turdus philomelos*
Tordo sassello *Turdus iliacus*
Tordela *Turdus viscivorus*
Pigliamosche *Muscicapa striata*
Pettirosso *Erithacus rubecula*
Usignolo *Luscinia megarhynchos*
Balia nera *Ficedula hypoleuca*
Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*
Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*
Codirossone *Monticola saxatilis*
Stiaccino *Saxicola rubetra*
Saltimpalo *Saxicola torquatus*
Culbianco *Oenanthe oenanthe*
Monachella *Oenanthe hispanica*

Prunellidae
Sordone *Prunella collaris*
Passera scopaiola *Prunella modularis*

Passeridae
Passera d'Italia *Passer italiae*
Passera mattugia *Passer montanus*
Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Motacillidae
Ballerina gialla *Motacilla cinerea*
Ballerina bianca *Motacilla alba*
Calandro *Anthus campestris*
Prispolone *Anthus trivialis*
Spioncello *Anthus spinoletta*

Fringillidae
Peppola *Fringilla montifringilla*
Fringuello *Fringilla coelebs*
Frosone *Coccothraustes coccothraustes*
Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*
Verdone *Chloris chloris*
Fanello *Linaria cannabina*
Crociere *Loxia curvirostra*
Cardellino *Carduelis carduelis*
Venturone *Carduelis citrinella*
Verzellino *Serinus serinus*
Lucherino *Spinus spinus*

Emberizidae
Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*
Zigolo giallo *Emberiza citrinella*
Zigolo nero *Emberiza cirlus*
Zigolo muciatto *Emberiza cia*
Ortolano *Emberiza hortulana*
Strillozzo *Emberiza calandra*

Bibliografia

• Arrigoni degli Oddi E., 1899. Note ornitologiche sulla Provincia di Verona. *Atti Soc. ital. Sc. Nat.*, 38 (1/2): 75-190.
• Benetti A., 1981. Gli uccelli nella cultura popolare della Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*: 7-22.
• De Franceschi P., 1991: Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 9: 154.
• De Franceschi P.F., Morbioli M., De Franceschi G., 2004: Gli uccelli (Lessinia Occidentale, Verona). In Latella L. (red.): Il Monte Pastello. *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona - 2. serie. Monografie Naturalistiche*, 1: 253-275.
• De Franceschi P.F., Parricelli P., 2002: Aquila reale, Pellegrino ed altri rapaci diurni in Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 25: 103-112.
• Sangster G., Collinson J.M., Knox A.G., Parkin D.T., Svensson L., 2010. Taxonomic recommendations for British birds: sixth Report. *Ibis* 152: 180–186.
• Sangster G., Collinson J.M., Crochet P.-A., Knox A.G., Parkin D.T., Svensson L., Votier S.C., 2011. Taxonomic recommendations for British birds: seventh Report. *Ibis* 153: 883–992.
• Sangster G., Collinson J.M., Crochet P.-A., Knox A.G., Parkin D.T., Votier S.C., 2012. Taxonomic recommendations for British birds: eighth Report. *Ibis* 154: 874-883.
• Sangster G., Collinson J.M., Crochet P.-A., Knox A.G., Parkin D.T., Votier S.C., 2013. Taxonomic recommendations for British birds: ninth Report. *Ibis* 155: 898–907.
• Sangster G., Collinson J.M., Crochet P.-A., Kirwan G.M., Knox A.G., Parkin D.T., Votier S.C., 2015. Taxonomic recommendations for British birds: 10th Report. *Ibis* 157: 193–200.
• Sighele M., Bon M, Verza E. (red.), 2011: Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2010. *Boll. Mus. St. Nat. Venezia*: 181-218.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2007: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2006. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 24.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2008: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2007. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2009: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2008. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2010: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2009. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2011: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2010. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2012: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2011. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2013: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2012. *Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching*: pp. 32.

Pettegola al Baito dei Pastori - *Paolo Parricelli*

Una giornata di birdwatching in Lessinia

Stamattina uscita in zona Vallene. Natura ancora addormentata anche se si avvertono i primi segnali di risveglio con abbondanti tappeti di chiusi crochi. Cielo coperto e temperature ancora rigide ci costringono ai ripari indossando felpa e sciarpa. In una delle pozze d'alpeggio, mentre risaliamo un bosco di faggi, improvvisamente si leva allarmato un piccolo gruppo di limicoli che non riusciremo a identificare... peccato! La zona attorno alla Casera Rambalda è un tripudio di canti di turdidi e fringillidi vari. Fa la sua comparsa un subadulto di Aquila reale tra il Corno Mozzo e il Corno d'Aquilio, osserviamo i nostri primi Culbianchi e Prispoloni di questo 2013. Scendendo verso l'abitato di Vallene si fa vedere vicinissimo anche un Nibbio bruno...

Vittorio Fanelli & Enza Grippo

Birdwatching a Verona e in Lessinia

Verona Birdwatching (*VR BW*) è un'associazione per la divulgazione del *birdwatching* e la salvaguardia dell'avifauna, principalmente in provincia di Verona. *VR BW* è impegnata sia nella ricerca che nella divulgazione, con pubblicazioni sull'avifauna provinciale e con conferenze.

Da oltre dieci anni *VR BW* è anche una *mailing list*, il supporto informatico dove gli iscritti si scambiano informazioni e segnalazioni. Nel sito web dell'associazione si possono trovare suggerimenti sui siti più interessanti per l'avifauna veronese, l'elenco delle osservazioni più particolari, un forum di discussione, un'ampia galleria di immagini, registrazioni audio e filmati esclusivamente dalla provincia di Verona.

www.veronabirdwatching.org
info@veronabirdwatching.org - 045 8301375

Parco Naturale Regionale della Lessinia
Comunità Montana della Lessinia
Piazza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
www.lessinia.verona.it - parcocultura@lessinia.verona.it
tel.: 045 6799211 - fax: 045 6780677

Associazione Verona Birdwatching
www.veronabirdwatching.org - info@veronabirdwatching.org