resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2016

Parco Naturale Regionale della Lessinia
Associazione Verona Birdwatching

Sparviere a Bosco Chiesanuova - ***Eugenio Pighi***

© Copyright 2018 Parco Naturale Regionale della Lessinia & Associazione Verona Birdwatching

Maurizio Sighele, Paolo Parricelli (a cura di), 2018: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2016. Parco Naturale Regionale della Lessinia e Verona Birdwatching, pp. 48.

In copertina: piviere tortolino a Castelberto, di Marco Boccafoli.
In quarta di copertina: monachella al Monte Loffa, di Maurizio Sighele

Verona birdwatching

PARCO Naturale Regionale della LESSINIA

resoconto ornitologico del Parco della Lessinia

anno 2016

a cura di

Maurizio Sighele
Paolo Parricelli

LESSINIA = MAGIA

Presentazione

Questo nuovo opuscolo della Collana dei Resoconti Ornitologici del Parco della Lessinia illustra i dati più significativi sull'avifauna selvatica della Lessinia raccolti nel 2016 dall'Associazione Verona Birdwatching: una delle molteplici peculiarità di un territorio ad alta valenza naturalistica, grazie alla presenza di una Natura generosa e multiforme tutelata dall'Area Protetta.

La Legge regionale istitutiva assegna al Parco la duplice funzione di presidio ambientale delegato alla salvaguardia delle risorse naturali e strumento in grado di favorire lo sviluppo eco-compatibile del territorio esaltandone potenzialità e risorse. Pertanto, la Comunità Montana della Lessinia, Ente gestore dell'Area Protetta, promuove e sostiene questo lavoro brillantemente giunto oramai alla sua undicesima edizione.

Sono lieto di presentare questa pubblicazione ed esprimere sincera gratitudine a Verona Birdwatching e a tutti coloro che con ammirevole e gratuito impegno hanno partecipato alla sua realizzazione, consegnandola a quanti vorranno scoprire o approfondire uno degli aspetti naturali più affascinanti della Lessinia.

Stefano Angelini

Commissario Straordinario Comunità Montana della Lessinia

Parco Naturale Regionale della Lessinia

Gheppio a Castelberto - ***Simone Grossule***

Introduzione

In questo resoconto sono annotate le segnalazioni più significative relative all'avifauna selvatica osservata durante il 2016 nel Parco Naturale Regionale della Lessinia e nelle aree limitrofe. Sono stati raccolti e analizzati dati riferiti a 149 specie diverse e le osservazioni sono state in seguito selezionate sulla base della loro importanza per la nidificazione, lo svernamento, gli erratismi, la curiosità o l'interesse locale.

Tra le segnalazioni più interessanti rilevate nel corso del 2016 si ricordano le prime osservazioni di **grifone**, **corriere piccolo** e **cutrettola testagialla orientale** che portano il numero complessivo dei *taxa* segnalati in questi resoconti a **188**. Inoltre: lo svernamento di una **poiana calzata**, la probabile nidificazione di una **monachella** in coppia ibrida con un culbianco, l'osservazione di specie sporadiche come **marzaiola**, **airone guardabuoi**, **albanella pallida**, **nibbio reale**, **porciglione**, **gru**, **gabbiano reale**, **gufo di palude**, **rondone pallido**, **picchio cenerino**, **grillaio**, **averla capirossa**, **cutrettola**.

Gran parte delle segnalazioni sono state raccolte dalla rete dell'associazione Verona Birdwatching. Ulteriori informazioni provengono dal personale del Servizio Guardaparco, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, dai Corpi di Polizia Provinciale di Verona e Vicenza e di Veneto Agricoltura durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio del territorio. Alcune segnalazioni sono giunte da appassionati, escursionisti, fotonaturalisti e residenti, altre dal portale *ornitho.it*. Tutte le immagini di questo resoconto sono state riprese in Lessinia nel corso del 2016. La tassonomia segue la *check-list* italiana aggiornata secondo le raccomandazioni della IOC (Brichetti & Fracasso, 2015; Gill & Donsker, 2017).

Hanno contribuito alla stesura di questa pubblicazione: *Mick Allen, Anna Bandieri, Claudio Bandieri, Marco Banterla, Arnaud Barras, Stefania Barugola, Domenico Benciolini, Nicola Benini, Leonardo Bergamini, Sergio Bergamini, Maurizio Bertacco, Paolo Bertini, Marco Boccafoli, Tommaso Borghetti, Marco Boschi, Romano Boschi, Paola Boschi, Michele Bottazzo, Guido Cavaliere, Ernesto Cavallini, Carla Chiappisi, Maurizio Cordioli, Valentina Corradi, Daniele Cozza, Vladimiro Cozza, Micaela Cristofoletti, Francesco Dal Dosso, Piero Dal Dosso, Marco Dal Zotto, Lorenzo Dalla Libera, Giangaetano Dalle Vedove, Michele Dall'O, Mauro D'offria, Elena Facchini, Igino Falco, Vittorio Fanelli, Nicola Giuriato, Nicola Grandi, Enza Grippo, Simone Grossule, Alessio Gualdo, Emanuele Iannone, Claudio Isotta, Cristiano Izzo, Augusto Laghi, Roberto Lerco, Maurizio Lezzi, Lorenzo Maffezzoli, Carlo Marcolini, Marco Melotti, Paolo Morandini, Luca Milione, Massimino Ovatoli, Guido Parmeggiani, Paolo Parricelli, Angelo Pasqua, Fabio Pegoraro, Gianluca Perlato, Daniele Peterlini, Marco Peterlini, Eugenio Pighi, Anna Pigozzo, Giulio Piras, Roberto Pollo, Luca Poltronieri, Davide Prandini, Sergio Rima, Giuseppe Rossi, Andrea Saorin, Luigi Sebastiani, Paola Selva, Giacomo Sighele, Maurizio Sighele, Luca Signori, Luca Signorini, Mario Spezia, Dorino Stocchero, Paola Tarasco, Massimo Tassinari, Simone Tiso, Ernesto Toffali, Fulvio Valbusa, Rosanna Valentini, Roberta Vignola, Luciano Vinco, Gianmaria Zago, Corrado Zanini, Debora Zani, Federico Zanzoni, Mario Zara.*

Grifone sul Corno d'Aquilio - ***Nicola Grandi***

Le osservazioni più interessanti del 2016

Alzavola ***Anas crecca***

Anatra di superficie osservata di frequente nelle pozze di abbeverata del Parco, soprattutto tra agosto e settembre:

1 ind. ai Parpari il 28.08 (M. Spezia);
8 indd. a San Giorgio il 19.09 (P. Parricelli).

Germano reale ***Anas platyrhynchos***

Anatra molto comune e diffusa, capita spesso anche in Lessinia, quasi sempre in periodo post-riproduttivo.

1 cp. a Casale di Sotto di Grezzana il 21.05 (C. Isotta);
4 indd. nei pressi di Malga Lessinia il 17.08 (G. Piras).

Marzaiola ***Anas querquedula***

Piccola anatra migratrice che prende nome dal fatto che arriva in Italia solitamente nel mese di marzo. Nel Parco in precedenza era stata segnalata solo due volte, nel marzo 2012 e nel settembre 2013 (Sighele & Parricelli, 2013; 2014):

4 indd. tra Malga Modo e Malga Vallina di Sopra, 1500 m slm, il 12 e il 21.08 (V. Cozza, A. Laghi).

Gallo cedrone ***Tetrao urogallus***

È una specie rara ed elusiva, motivo per il quale è sempre poco segnalata in Lessinia, anche se talora, come tra il 2009 e il 2011, alcuni individui (definiti "pazzi") si sono resi assai visibili (Sighele & Parricelli, 2010; 2011; 2012). Nei censimenti istituzionali primaverili condotti nella sola arena di canto nota nel territorio del Parco è stato avvistato 1 m. il 13.04 e rinvenute tracce di presenza sino a maggio inoltrato (P. Parricelli, L. Signori, F. Valbusa, E. Iannone, V. Corradi). Inoltre:

1 f. nel Vajo dei Modi il 3.07 (D. Peterlini, M. Peterlini);
1 f. sul Corno d'Aquilio il 24.12 (M. Ovatoli).

Marzaiole a Malga Modo - ***Augusto Laghi***

Fagiano di monte ***Lyrurus tetrix***

Rispetto alla specie precedente è segnalata più spesso perché nel periodo riproduttivo canta in arene aperte ed è possibile osservarla o almeno sentire il suo caratteristico rugolio. Presente quasi esclusivamente nei settori nord-orientali del Parco. Nei censimenti istituzionali nelle arene di canto, tra l'11 e il 24.05, è stato conteggiato un minimo certo di 25 indd. (18 mm. e 7 ff.) così ripartiti:

Valon: 7 mm. l'11.04, 6 mm. il 20.04, 5 mm. il 28.04 (P. Parricelli, L. Signori, F. Valbusa); inoltre 3-4 mm. anche il 30.04 (P. Bertini, C. Izzo, M. Allen);

Campobrun: 6 mm. e 4 ff. l'11.05 (P. Parricelli, M. Bottazzo, P. Boschi, P. Dal Dosso);

alta Val Fraselle: 4 mm. e 2 ff. il 4.05, 2 mm. il 24.05 (M. Bottazzo, P. Parricelli, P. Dal Dosso, D. Benciolini).

Passo Zevola-Molesse-Passo Lora: 1 m. e 1 f. il 4.05 (P. Boschi, P. Dal Dosso);

Nei censimenti istituzionali svolti per accertare il successo riproduttivo, tra il 3 e l'11.09, è stato conteggiato un minimo certo di 37 indd. così ripartiti:

Valon-Trappola-Bella Lasta il 3.09, l'8.09 e l'11.09: 1 f. con covata di 4 juvv., 1 f. con covata di 4 juvv., 3 ff. senza covata, 8 mm., 2 juvv. (P. Parricelli, F. Valbusa, L. Signori, D. Prandini, P. Selva, S. Tiso *et al.*);

Foresta Demaniale Regionale di Giazza (Passo Lora-Zevola-Molesse-Alta Val Fraselle-Gramolon-Lobbia) il 7.09: 1 f. con covata di 2 juvv., 1 f. con covata di 1 juv., 6 ff. senza covata, 3 mm. (F. Pegoraro, A. Gualdo, G. Rossi et al.).

Coturnice ***Alectoris graeca***

Fasianide poco comune e localizzato, è segnalato quasi esclusivamente in Lessinia nord-orientale.

2 indd. al Pigarolo il 2.04, 1 ind. il 21.04 (G. Perlato, P. Parricelli);

2 indd. in alta Val Fraselle - Monte Gramolon (VI) il 31.05 (D. Stocchero);

1 ind. sul Monte Zevola (VI) il 27.09 (D. Stocchero).

Fagiano di monte - ***Luca Signorini***

Cormorani in volo sopra Malga Spazzacamina - ***Luca Signorini***

Cicogna nera ***Ciconia nigra***

La prima segnalazione nota per la Lessinia è abbastanza recente, risale infatti al 2007 (Sighele & Parricelli, 2008), ma da allora la cicogna nera è stata osservata di frequente, seppur in modo irregolare e piuttosto scarsa, tra luglio e settembre.

1 ind. a Dosso Alto il 10.07 (A. Pigozzo, M. Boschi);
1 ind. a Bocca di Selva il 21.07 (M. Lezzi);
1 ind. a Sengio Rosso il 23.07 (C. Marcolini, G. Cavaliere).

Cormorano ***Phalacrocorax carbo***

Specie tipica delle zone umide che almeno dal 2016 nidifica anche in provincia di Verona, al Laghetto del Frassino. Dai dati raccolti in questi anni si evidenzia che individui in migrazione sorvolano regolarmente l'altipiano soprattutto nel mese di marzo, mentre nel 2016 le osservazioni sono state anticipate di una quindicina di giorni:

6 indd. sopra San Giorgio il 19.02 (P. Parricelli);
30 indd. sopra Malga Spazzacamina il 20.02 (P. Parricelli, L. Signorini);
23 indd. in volo sopra il Vajo dei Falconi il 14.09 (E. Cavallini).

Grifone sul Corno d'Aquilio, con corvo imperiale - ***Nicola Grandi***

Grifone ***Gyps fulvus***

Questo avvoltoio è di comparsa regolare in Veneto, ma è piuttosto scarso, contattato un po' più frequentemente nell'ultimo decennio con una media di 3-4 segnalazioni ogni anno (Sighele & Tormen, 2016). Nel 2016 è stata registrata la prima segnalazione documentata anche in Lessinia:

1 ind. sopra Fosse, tra Camparso e Rocca Pia, nella terza decade di ottobre fino all'1.11, si nutriva della carcassa di un cavallo (P. Morandini, N. Grandi).

Biancone ***Circaetus gallicus***

Questo grande rapace migratore dalla testa massiccia si nutre di rettili che cerca in volo librandosi in aria; arriva in Lessinia in primavera per lasciarla ai primi di settembre. Scarso in tutto il Veneto, si osserva però sull'altipiano lessinico in tutto il periodo riproduttivo. Raggruppando per aree, nel 2016:

1 ind. a Monte di Fumane il 3.07 (G. Dalle Vedove *et al.*);
1 ind. a Vallene il 12 e il 30.04, poi ancora il 30.06 e il 6.08 (V. Fanelli, P. Bertini, C. Izzo *et al.*); 1 ind. a Fittanze tra il 16 e il 30.07 (M. Sighele, R. Vignola, E. Cavallini, M. Dall'O);
1 ind. a Bocchetta della Vallina il 22 e il 30.07 (E. Cavallini);
1 ind. a Bocca di Selva il 30.06 (M. Tassinari); 1 ind. sul Monte Tomba il 9.07 (E. Toffali, P. Tarasco); 1-2 indd. tra Castelberto e Podestaria tra il 13.08 e il 4.09 (M. Sighele, C. Izzo *et al.*);
1 ind. a San Giorgio il 18.04, 1-2 indd. tra San Giorgio e i Parpari tra il 18.06 e il 13.08 (G. Dalle Vedove, S. Grossule, M. Sighele, C. Izzo, L. Dalla Libera *et al.*);
1-2 indd. a Cava Belloca tra il 14.05 e il 17.07 (M. Bertacco, C. Izzo);
1 ind. a Cancello, Verona, il 9 e il 16.08 (C. Izzo, L. Milione);
1 ind. a Praole il 17.08 (C. Isotta).

Biancone - ***Luca Signori***

Aquila reale ***Aquila chrysaetos***

Tutta l'area degli alti pascoli è particolarmente indicata per osservare questo maestoso rapace, l'uccello più grande tra quelli che si riproducono in Lessinia. Dal 2006 è stata ripetutamente accertata la riproduzione nella zona di Giazza con corteggiamento e accoppiamento tra gennaio e febbraio, deposizione in marzo-aprile, pulli a metà maggio, involo tra metà luglio e la prima decade di agosto. In tale area a partire dai primi di settembre è stato ripetutamente avvistato 1 juv. accompagnato da 1-2 add. (R. Boschi, P. Parricelli, L. Signori). In Lessinia si possono osservare anche individui erratici o che provengono dall'area del Baldo e probabilmente anche dalla Val d'Adige. Si ricorda solo:

a Vallene 1 ad. e 2 subadd. il 17.01, 2 add. il 23.03 e il 10.04, 2 add. e 1 subad. il 17.04, 1 ind. posato e 1 ind. in volo il 29.10, 2 add. l'11.12, 4 indd. il 18.12 (V. Fanelli, C. Izzo, M. Allen, C. Chiappisi *et al.*);

2 ind. sopra il Monte Tregnago, Cerro V.se, il 28.05 (C. Isotta);

3 indd. a San Giorgio il 10.10 (M. Allen, C. Izzo).

Astore ***Accipiter gentilis***

Agile rapace delle zone boscate che mostra un evidente dimorfismo tra i due sessi, con la femmina decisamente più grande, delle dimensioni simili a quelle di una poiana. In Lessinia è osservato prevalentemente al Ponte dell'Anguillara e in Val Squaranto. Nel 2016 è stato segnalato una quindicina di volte: a Vallene, ai Folignani, a Castelberto, a Malga Valbella, a Grezzana e a Breonio (V. Fanelli, C. Izzo, R. Lerco, C. Isotta *et al.*).

Falco di palude ***Circus aeruginosus***

Rapace che in provincia si osserva un po' tutto l'anno nei pressi di zone umide a canneto. In Lessinia dal 2006 sono regolarmente segnalati individui in migrazione, durante i due periodi di passo migratorio:

1 ind. a Spiazzoi il 2.04 (G. Perlato);

1 ind. a Vallene il 10.04 (V. Fanelli);

1 ind. a Castelberto il 31.08 (M. Allen, C. Izzo).

Aquila reale - *Luca Signori*

Albanella reale ***Circus cyaneus***

Qualche individuo di questa albanella è stato segnalato ogni anno in Lessinia dall'inizio di questi resoconti, soprattutto durante i passi migratori, mentre l'osservazione in periodo invernale è più rara:

1 m. a Podestaria l'1.01, 1 f. a nord di Malga Lessinia il 26.01, segnalati in zona dall'autunno 2015 (L. Signori, A. Pasqua *et al.*; Sighele & Parricelli, 2017a);
1 ind. a Malga Lessinia il 15.04 (P. Parricelli);
1 ind. a Falz il 7.11 (G. Dalle Vedove).

Albanella pallida ***Circus macrourus***

Questo agile rapace migratore in Europa nidifica prevalentemente in Russia. Rara in provincia di Verona, nel 2017 è stata segnalata la terza osservazione in tre anni in Lessinia (Sighele & Parricelli, 2017a; 2017b):

1 m. a Dosso Alto il 31.08 (C. Izzo, M. Allen).

Albanella minore ***Circus pygargus***

Albanella migratrice che sverna in Africa e nidifica in aree di pianura coltivate a cereali, in prati erbosi o a margine di zone umide, qualche coppia anche in provincia di Verona. In Lessinia è contattata quasi esclusivamente nei periodi di passo migratorio, prevalentemente in primavera inoltrata, ma non solo.

1 ind. a San Giorgio il 13.08 (M. Sighele, G. Sighele *et al.*).

Nibbio reale ***Milvus milvus***

Rapace migratore delle dimensioni maggiori di una poiana e dalla coda assai forcuta, in Europa nidifica prevalentemente in Germania. Individui delle popolazioni del nord-est del continente migrano verso sud e pertanto questa specie si osserva anche in Lessinia, seppur sporadicamente.

1 ind. a Vallene il 26.03 (V. Fanelli, F. Zanzoni, S. Grossule);
1 ind. a Pian di Castagnè il 13.12 (C. Izzo).

Poiana calzata ***Buteo lagopus***

Rapace a distribuzione circumartica simile alla poiana, ma leggermente più grande; sverna in Europa centrale o sud-orientale, pochi individui arrivano anche in Italia, assai di rado in provincia di Verona. Come già ricordato, 1 ind. di questa specie è stato osservato per diversi mesi a partire dal 9.11.2015, soprattutto nei dintorni di Malga Lessinia, ma anche a Vallene, Fittanze, Castelberto e Bocca di Selva (Sighele & Parricelli, 2017b). Le osservazioni sono proseguite fino al 28.04 (L. Signori, P. Parricelli, M. Cordioli, C. Izzo, D. Cozza *et al.*).

Porciglione ***Rallus aquaticus***

È una specie elusiva legata ai canneti, quindi la sua osservazione in Lessinia è alquanto insolita. Anche l'unica precedente segnalazione riguardava un individuo ritrovato deceduto (Sighele & Parricelli, 2009):

1 ind. trovato deceduto a Grietz il 7.04 (N. Benini).

Poiana calzata (qui sopra) e **albanella reale** a Malga Lessinia - ***Luca Signori***

Re di quaglie ***Crex crex***

Rallide migratore che resta quasi sempre "immerso" nell'erba alta da dove emette il classico canto (*crè-crè*, *crè-crè*) dal quale deriva il suo nome scientifico. In Lessinia questa specie è stata segnalata sporadicamente nel passo migratorio primaverile, ma dal 2010 sono stati regolarmente contattati maschi in canto tra la seconda metà di giugno e la prima metà di luglio, soprattutto nei settori orientali del Parco.

1-3 indd. in canto a Campofontana tra l'8 e il 26.06 (P. Parricelli, M. Allen, G. Dalle Vedove, E. Cavallini *et al.*);
1 ind. sul Valon l'1.07 (L. Milione).

Gru ***Grus grus***

Uccello di grandi dimensioni osservato in Italia e in Veneto soprattutto durante le migrazioni, quando stormi chiassosi di numerosi individui passano in volo in formazioni a "V", soprattutto a fine ottobre-novembre prima e a febbraio-marzo poi. In questi periodi la gru è stata osservata anche in Lessinia, almeno dal 2009:

24 indd. in volo verso nord sopra il Corno d'Aquilio il 4.03 (A. Barras);
102 indd. in due diversi stormi sopra Cancello, Verona, il 6.03 (C. Izzo);
alcuni indd. a San Mauro di Saline il 28.10 (F. Pegoraro);
3 indd. a San Giorgio il 29.10 (A. Pasqua);
due stormi di circa 200 e 70 indd. nei pressi di Vestenanova il 28.11 (F. Pegoraro).

Falco pecchiaiolo a Rancani - ***Simone Grossule***

Poiana a Sprea - ***Simone Grossule***

Nibbi bruni ai Parpari - ***Cristiano Izzo***

Piviere tortolino a Castelberto - ***Valentina Corradi***

Corriere piccolo ***Charadrius dubius***

Prima segnalazione di questo limicolo che nidifica in provincia di Verona nella zona delle risaie, lungo il corso dell'Adige e in zone con ghiaia e incolti come aree industriali o cave:

1 ind. a Malga Modo il 25.04 (A. Laghi).

Piviere tortolino ***Charadrius morinellus***

Piviere che si trova comunemente lontano dall'acqua, nidifica prevalentemente all'estremo nord dell'Europa e sverna in Africa. Durante le migrazioni sosta spesso in ambienti aperti di alta quota dove si può incontrare quasi per caso: essendo piuttosto mimetico, resta immobile sul terreno e si invola molto raramente, rendendo difficile la sua osservazione. In Lessinia capita di rado in primavera, mentre sembra regolare la sua presenza tra la fine di agosto e la metà di settembre tra Castelberto e Podestaria. Il numero degli individui può cambiare giorno dopo giorno perché nuovi arrivati possono aggiungersi a quelli giunti qualche giorno prima, con un continuo ricambio.

8 indd. tra Malga Costeggioli di Sopra e Castelberto il 31.08, quindi 1-12 indd. tra il 4 e il 25.09 (C. Izzo, M. Allen, P. Parricelli, L. Signorini, F. Zanzoni *et al.*).

Frullino ***Lymnocryptes minimus***

Questo limicolo è segnalato occasionalmente nelle pozze d'alpeggio della Lessinia durante i periodi dei passi migratori.

1 ind. a Dosso Alto il 27.04 (M. D'offria).

Piro piro culbianco ***Tringa ochropus***

Limicolo che nidifica in nord Europa e passa l'inverno in Africa, anche se qualche individuo si ferma molto prima, anche in provincia di Verona. Dal 2007 è stato quasi sempre osservato in sosta migratoria in Lessinia, soprattutto in luglio e agosto.

1 ind. a Brutti il 2.04 (E. Pighi);

1 ind. a Fittanze il 17.04 (V. Fanelli);

1 ind. a Malga Rambalda il 3.07 (V. Fanelli, E. Grippo).

Piviere tortolino - *Luca Signorini*

Piro piro culbianco a Brutti - ***Eugenio Pighi***

Corriere piccolo a Malga Modo - ***Augusto Laghi***

Piro piro boschereccio a Malga Rambalda - ***Vittorio Fanelli***

Gufo di palude a Vallene - ***Simone Grossule***

Piro piro boschereccio ***Tringa glareola***

Limicolo che nidifica in Scandinavia e in Russia, può sostare in Lessinia durante i passi migratori da o verso i quartieri di svernamento africani:

4 indd. a Parparo di Sopra il 18.04 (P. Parricelli);
1 ind. a Malga Rambalda il 21.04 (V. Fanelli);
1 ind. tra Malga Fanta e Malga Modo tra il 22 e il 30.04 (A. Laghi *et al.*).

Gabbiano reale ***Larus michahellis***

È uno dei gabbiani più facili da osservare in provincia di Verona, dove l'unico sito di nidificazione noto è sull'Isola Trimelone; specie sporadica in Lessinia.

3 indd. osservati da Cima Trappola in Val dei Ronchi il 26.12 (L. Maffezzoli).

Assiolo ***Otus scops***

È un rapace notturno che sverna soprattutto in Africa e nidifica diffusamente in provincia di Verona e in Lessinia, anche se il numero di coppie è piuttosto limitato.

1 ind. a Malga Vazzo il 30.04 (P. Bertini, C. Izzo, M. Allen);
1 ind. a Rosaro il 15.06 (C. Isotta);
1 ind. a Morandini il 23.07 (R. Pollo);
1 ind. a Fosse il 30.07 (N. Giuriato).

Gufo reale ***Bubo bubo***

Anche nel 2016 è stata accertata la riproduzione di questo maestoso rapace notturno alle pendici dell'altipiano lessinico, in alta Valpantena, 450 m slm, con presenza di 2 pulli a partire dalla fine di maggio, mentre il 6.06 uno dei due giovani era pronto all'involo (P. Parricelli, C. Chiappisi, M. Sighele, G. Sighele *et al.*). Inoltre:

1 m. e 1 f. a Molina il 10.04 (C. Zanini);
1 ind. nell'alto Vajo dell'Anguilla il 31.10 (L. Signori, F. Valbusa, M. Peterlini).

Civetta capogrosso ***Aegolius funereus***

Rapace notturno che preferisce le foreste mature di conifere o faggi, dove nidifica in cavità su albero, quali nidi abbandonati di picchio nero. In Lessinia è contattata più di frequente nelle foreste di Giazza o dei Folignani.

1 ind. a Vallina di Sotto nel mese di marzo (P. Parricelli);
1 ind. ai Folignani il 7.11 (G. Dalle Vedove).

Gufo di palude ***Asio flammeus***

Strigide che si osserva in Italia nei mesi invernali e che capita di rado in Lessinia durante i passi migratori; aprile è il mese col maggior numero di segnalazioni:

1 ind. a Vallene l'11.04 (S. Grossule).

Gruccione ***Merops apiaster***

Colorata specie migratrice che è segnalata regolarmente in Lessinia dal 2011 nei due passi migratori, assai di rado in periodo riproduttivo, talora anche in stormi di oltre 100 individui (Sighele & Parricelli, 2012-2017b).

25 indd. sopra il Monte Tregnago, Cerro V.se, il 15.08 (C. Isotta);
15 indd. a Rosaro il 24.08 (C. Isotta).

Falco cuculo a Dosso Alto - ***Giacomo Sighele***

Picchio nero ***Dryocopus martius***

È il più imponente picchio italiano, tipico delle foreste più mature; alcune coppie nidificano in Lessinia a quote medio-elevate, mentre nei mesi invernali si sposta sempre più frequentemente nei fondovalle o anche in zone boscate di pianura. Nel 2016 è stato segnalato a Vallene, Folignani, Scandole, Camposilvano, Squarantello, Giare e nella Foresta di Giazza (V. Fanelli, M. Allen, C. Izzo *et al.*).

Picchio cenerino ***Picus canus***

Questo picchio ricorda il picchio verde sia per il piumaggio che per il canto, ma la sua presenza in Lessinia è molto sporadica, anche se recentemente il numero di segnalazioni sembra essere aumentato (Parricelli, 2007; Sighele & Parricelli, 2013).

1 ind. in canto nella Foresta dei Folignani il 29.01 (L. Signori, P. Parricelli, V. Corradi);
1 ind. tra Malga Maso e Arnezzo il 10.03 (L. Signori, P. Parricelli);
1 ind. in Val di Revolto - Orti Forestali in aprile (P. Parricelli, L. Signori, A. Saorin).

Grillaio ***Falco naumanni***

Falchetto migratore che nidifica in Italia meridionale, specialmente in Basilicata e in Puglia, mentre di recente qualche coppia si è insediata anche in Pianura Padana. Poco noto in provincia di Verona fino a qualche anno fa, dal 2011 è stato osservato ogni anno durante il periodo post-riproduttivo nelle zone collinari che dall'altipiano della Lessinia arrivano fino al comune di Verona, soprattutto tra Velo Veronese e Cancello tra i primi di agosto e la prima decade di settembre, una sola volta anche a fine maggio ai Parpari (Sighele & Parricelli, 2013).

1 ind. a Branchetto il 16.04 (L. Milione);
1-2 indd. a Cancello tra il 30.07 e il 16.08 (C. Izzo, M. Allen, E. Cavallini, L. Milione).

Grillaio a Cancello - ***Ernesto Cavallini***

Falco cuculo ***Falco vespertinus***

Falco migratore che per spostarsi dai quartieri di svernamento a quelli di nidificazione passa per l'Italia e in questo periodo può sostare anche in Lessinia, talora in gruppi di diversi individui. Dopo la riproduzione la migrazione interessa prevalentemente i Balcani, quindi è difficile osservarlo nel Parco in periodo tardo-estivo.

1 ind. ai Parpari il 21.05 (C. Izzo);
1 ind. a Dosso Alto tra il 13 e il 16.08 (M. Sighele, G. Sighele, E. Cavallini *et al.*);
1 ind. a Passo Branchetto il 23 e il 25.08 (L. Signorini, L. Milione).

Smeriglio ***Falco columbarius***

Falchetto che nidifica nelle parti settentrionali della regione olartica, segnalato regolarmente in Lessinia durante le migrazioni, più di rado nei mesi più freddi.

1 ind. a Calcari di Grezzana il 6.01 (C. Isotta).

Lodolaio ***Falco subbuteo***

Anche questo falco è un migratore di lungo raggio; nidifica anche in provincia di Verona perlopiù in zone boscate di pianura, ma sulle Alpi sono segnalate riproduzioni fino ai 1200 m slm (Brichetti & Fracasso, 2003). In Lessinia era noto solo in zona collinare, ma dal 2007 è osservato regolarmente nel Parco, anche in periodo riproduttivo. Al di fuori della zona collinare è stato osservato tra il 2.06 e il 7.09:

1 ind. sul Monte Loffa il 2.06 (M. Sighele, V. Fanelli *et al.*);
1 ind. a Vallene il 3.07 (G. Dalle Vedove);
1 ind. a San Giorgio il 23.07, il 13.08 e il 4.09 (C. Izzo, M. Sighele *et al.*);
1 ind. a Castelberto il 7.09 (S. Grossule).

Falco pellegrino ***Falco peregrinus***

Falcone che si è insediato nel Parco della Lessinia da una ventina d'anni, si osserva soprattutto sulle pareti rocciose del Corno d'Aquilio (versante Val d'Adige), nel Vajo dell'Anguilla, in alta Valpantena (Vajo della Marciora e Vajo dei Falconi), in Val Squaranto e in Val di Revolto. Nel 2016 in Lessinia è stato segnalato soprattutto nella seconda metà dell'anno, tra giugno e novembre, quando alle coppie nidificanti si sono aggiunti i giovani nati e individui erratici.

Averla maggiore ***Lanius excubitor***

Questo passeriforme, la più grande delle averle, visita regolarmente la provincia di Verona nei mesi invernali, ma si tratta sempre di pochi individui. Alcuni svernano regolarmente in Lessinia, soprattutto a Passo Fittanze, San Giorgio, Conca dei Parpari e a San Rocco di Piegara.

1 ind. alla Valle delle Sfingi il 7.01 (C. Izzo);
1 ind. a Passo Liana, Corno d'Aquilio, il 13.01 (T. Borghetti);
1 ind. a Gaspari il 17.01 (S. Grossule).

In seguito:

1 ind. a Malga Costeggioli il 22.10 (M. Peterlini, D. Peterlini);
1 ind. a Dosso Alto il 16.11 (P. Bertini);

1 ind. ai Parpari tra il 23.11 e il 5.12 (E. Cavallini, L. Milione *et al.*);
1 ind. in Val Sguerza il 27.11 (E. Cavallini, M. Spezia *et al.*).

Averla capirossa ***Lanius senator***

Come tutte le averle, anche l'averla capirossa soffre di un importante declino che alla fine del XX secolo l'ha vista praticamente sparire del tutto come nidificante in Pianura Padana. Qualche individuo capita ancora in provincia di Verona in periodo pre-riproduttivo, mentre 30 anni fa nidificava nelle colline della Lessinia (De Franceschi, 1991).
2 indd. a Rosaro tra il 27.05 e i primi di giugno (C. Isotta).

Cornacchia nera ***Corvus corone***

Questa cornacchia è assai più rara della congenere cornacchia grigia, con la quale talora forma coppie miste. Nidifica sporadicamente in provincia di Verona, mentre le osservazioni invernali sono più comuni, anche in Lessinia, dove nel 2016 è stata rilevata soprattutto nella zona di Vallene (V. Fanelli). Inoltre si segnala:
1 ind. a Malga Lessinia il 15.04 (P. Parricelli);
1 ind. con imbeccata a Monte il 16.04 (G. Dalle Vedove);
1 ind. a Rosaro il 10.05 (P. Parricelli);
1 ind. nel Vajo Paradiso il 17.05 (C. Isotta).

Tottavilla ***Tichodroma muraria***

Questa allodola nidifica abbastanza diffusamente negli alti pascoli della Lessinia, l'area veneta di presenza riproduttiva più consistente e regolare, segnalata di frequente anche nel 2016 sul Monte Solane, a Vallene, a Bocca di Selva, a Cava Belloca, mentre a partire dal mese di agosto è stata contattata in varie zone della

Merlo dal collare a San Giorgio - ***Simone Grossule***

Lessinia pedemontana. In periodo di nidificazione, al di fuori dei siti più noti:
1 ind. in canto a Cerna il 16.07 (M. Sighele, R. Vignola).

Balestruccio ***Delichon urbicum***

Rondine piuttosto comune che nidifica diffusamente anche nel Parco in corrispondenza degli abitati, anche a quote elevate come a San Giorgio o al Branchetto. Si segnala un caso di aberrazione cromatica:
1 ind. albino a Griez il 31.07 e a San Giorgio il 4.08 (L. Poltronieri, L. Dalla Libera).

Occhiocotto ***Sylvia melanocephala***

Questa silvia tipica della macchia mediterranea, ma anche delle oasi xerotermiche, è noto in Lessinia solo a bassa quota o nei fondovalle. Nel 2016 è stato osservato nel comune di Grezzana a Calcari, l'8.01 e il 12.03, e a Missago, il 2.12 (C. Isotta).

Picchio muraiolo ***Tichodroma muraria***

Passeriforme che vive solitamente su pareti rocciose piuttosto ripide, talora lo si osserva anche su abitazioni in pietra, anche a bassa quota. A tal proposito:
1 ind. tra le case a Giazza il 31.03 (G. Perlato *et al.*).

Merlo dal collare ***Turdus torquatus***

Turdide migratore che usualmente giunge nel Parco tra marzo e aprile, osservato poi fino a metà novembre nella zona delle conifere e degli arbusti soprattutto tra i 1400 e i 1700 m slm. Nel 2016 i primi arrivi sono stati segnalati tra San Giorgio e Scalorbi in aprile (P. Bertini, C. Izzo, M. Allen *et al.*), l'ultimo individuo a Fittanze il 16.11 (A. Laghi).

Codirossone con anello abruzzese a San Giorgio **-** ***Maurizio Sighele***

Cesena ***Turdus pilaris***

Turdide migratore abbastanza comune e numeroso nei mesi invernali, la sua nidificazione in Lessinia era ritenuta eccezionale (De Franceschi, 1991). Di recente ha nidificato più volte, seppur con un numero assai esiguo di coppie, tra il 2010 e il 2012 (Sighele & Parricelli, 2011; 2012; 2013) e ancor prima nel 2005 (C. Isotta & M. Pesente, com. pers.):

almeno 1 cp. ha nidificato a San Giorgio, con la presenza di 2 add. al nido il 30.06, pulli osservati tra il 23.07 e il 6.08 (C. Izzo, S. Grossule, M. Tassinari, P. Parricelli *et al.*);

2 indd. a Malga Valbella il 23.07 (R. Lerco).

Codirossone ***Monticola saxatilis***

Migratore transahariano che nidifica nei rilievi collinari e montuosi con pietraie, rocce e scarsa vegetazione. In Lessinia è poco numeroso, ma regolare, tra i 1300 e i 1600 m, dove si osserva di solito tra metà aprile e settembre. La prima segnalazione provinciale del 2016 è stata segnalata a Campiano il 2.04 (M. Bertacco), in seguito questa specie è stata osservata in alta Lessinia tra il 18.04 e il 4.09, quando almeno 1 cp. ha nidificato a San Giorgio e probabilmente anche a Branchetto (P. Bertini, C. Izzo, G. Dalle Vedove *et al.*). A San Giorgio, così come nel 2014, è stato osservato più volte anche 1 m. marcato con anello metallico che è stato inserito sul Gran Sasso nel 2011 (C. Izzo, M. Sighele, C. Bandieri *et al.*; Sighele & Parricelli, 2017). Inoltre:

1 ind. a Bocchetta della Vallina il 29.04 (A. Laghi).

Zigolo giallo - *Gianmaria Zago*

Tordo sassello - *Gianmaria Zago*

Culbianco - *Luca Signorini*

Averla piccola a San Giorgio - ***Simone Grossule***

Monachella ***Oenanthe hispanica***

Specie segnalata irregolarmente in provincia di Verona nel XX secolo, anche come nidificante, mentre negli ultimi anni risulta assai sporadica, con poche osservazioni proprio dalla Lessinia. Maschi dalla forma a gola scura della ssp. *melanoleuca*, infatti, sono stati segnalati nelle cave del Monte Loffa nel giugno 2013 e tra i primi di maggio e i primi di giugno 2014 (Sighele & Parricelli, 2014; 2017). Nel 2016, ancora sul Monte Loffa, a partire dal 2.06 è stato osservato 1 m. della ssp. *melanoleuca*, in questo caso a gola chiara, che si accompagnava a 1 f. di culbianco. Nei giorni successivi i due individui sono stati osservati con imbeccata per i nidiacei, ma per l'impossibilità di approccio senza disturbare la nidificazione, non è stato possibile accertare se accedessero allo stesso nido, seppur sia probabile; anche perché, a parte la fugace presenza di 1 m. subad. di culbianco, in tutto il periodo riproduttivo non sono stati osservati nè femmine di monachella, nè maschi di culbianco. Dai primi di luglio erano presenti anche 2 juvv. *Oenanthe*, verosimile frutto della coppia ibrida. Il maschio di monachella è stato segnalato in seguito almeno fino al 14.08 (E. Grippo, V. Fanelli, M. Sighele, R. Vignola, G. Sighele, S. Grossule *et al.*).

Tramite il *QR code* qui a lato si accede a un *link* per ascoltare le vocalizzazioni di questa monachella.

giovane *Oenanthe* al Monte Loffa - ***Maurizio Sighele***

Monachella al Monte Loffa - ***Simone Grossule***

Fringuello alpino ***Montifringilla nivalis***

Passeriforme tipico degli ambienti rocciosi, nidifica ad alta quota oltre i 1800 m slm, ad esempio sul Carega. Visita la Lessinia pertanto quasi esclusivamente nei mesi più freddi.

20-42 indd. a Bocca di Selva tra il 12.02 e il 10.03 (S. Rima, R. Lerco, P. Parricelli, M. Cristofoletti, E. Cavallini, C. Isotta *et al.*);
1 ind. a San Giorgio il 6.03 (C. Izzo);
5 indd. a Branchetto il 13.03 (D. Zani);
15 indd. a Malga Lessinia il 25.09 (G. Parmeggiani).

Sordone ***Prunella collaris***

Come la specie precedente, anche il sordone è una specie che nidifica in quota, tra i 2000 e i 3000 m slm, e arriva sui Monti Lessini quasi esclusivamente nei mesi invernali, più facile da osservare a San Giorgio e al Pigarolo.

1 ind. a Vallene il 6.01, 2 indd. il 16.02 (V. Fanelli);
5-9 indd. a San Giorgio tra il 17.01 e il 2.03 (S. Grossule, F. Zanzoni, C. Izzo *et al.*);
12 indd. a Malga Folignani di Cima il 18.01 (P. Parricelli);
1 ind. a Castelberto il 18.01 (P. Parricelli);
6-11 indd. a Bocca di Selva tra l'11.02 e il 6.03 (S. Rima, C. Isotta, R. Lerco, M. Cristofoletti, P. Parricelli *et al.*).

L'inverno successivo:

13 indd. al Pigarolo il 28.11 (P. Parricelli);
11 indd. a Malga Lessinia il 23.12 (P. Parricelli).

Fringuello alpino a Bocca di Selva - ***Luigi Sebastiani***

Sordone a Bocca di Selva - ***Roberto Lerco***

Cutrettola ***Motacilla flava***

Motacillide migratore, arriva in Europa in aprile per nidificare in pianura, anche nel Veronese, soprattutto nella zona delle risaie di Isola della Scala. In Lessinia è stata segnalata assai di rado durante le migrazioni.

10 indd. ca. a Dosso Alto il 31.08 e l'1.09 (M. Allen, C. Izzo).

Cutrettola testagialla orientale ***Motacilla citreola***

Prima osservazione per la Lessinia di questa specie tipica delle regioni centroasiatiche, ma che nidifica anche in Europa orientale. In Italia è assai rara e per il Veneto esistevano solo altre 6 segnalazioni:

1 m. in migrazione nei pressi di Podestaria il 4.09 (G. Sighele).

Crociere ***Loxia curvirostra***

Specie che visita regolarmente le montagne veronesi con presenza di conifere, osservata più di frequente nei mesi più freddi che però possono coincidere col periodo di nidificazione, poichè spesso si riproduce anche a gennaio o febbraio, ma nidiate sono state rilevate tutto l'anno. La segnalazione più interessante:

50 indd. a Malga Tommasona il 3.07 (P. Parricelli).

Lucherino ***Spinus spinus***

Questo fringillide nidifica in zone forestali anche sulle Alpi, soprattutto centro-orientali, ma in provincia di Verona non si conoscono eventi riproduttivi, almeno recenti. È invece assai comune, anche in pianura, durante le migrazioni o nei mesi invernali. Si ricorda pertanto una interessante osservazione, visto il periodo:

1 ind. in canto al Pigarolo il 4.06 (C. Chiappisi, C. Izzo).

Lucherino al Pigarolo - ***Carla Chiappisi***

Zigolo delle nevi ***Plectrophenax nivalis***

Per questa specie, regolare in Lessinia, ma così scarsa in Italia, è stato registrato un numero ridotto di individui, probabilmente per la poca neve scesa, evento che, come già rilevato, riduce la possibilità di osservazione (Sighele & Lerco, 2015):

1-2 indd. a Bocca di Selva tra il 5.01 e il 13.03, 3 indd. solo l'8.03 (M. Banterla, C. Izzo, P. Parricelli, R. Lerco, S. Rima, M. Melotti *et al.*).

Zigolo delle nevi a Bocca di Selva - ***Luigi Sebastiani***

Fanello - *Eugenio Pighi*

Picchio muratore - *Eugenio Pighi*

Codirosso spazzacamino - *Eugenio Pighi*

Famiglia di **rampichini alpestri** a Vallène - ***Simone Grossule***

Specie segnalate in Lessinia nel 2016

Anseriformes
Anatidae
Germano reale *Anas platyrhynchos*
Alzavola *Anas crecca*
Marzaiola *Anas querquedula*

Galliformes
Phasianidae
Gallo cedrone *Tetrao urogallus*
Fagiano di monte *Lyrurus tetrix*
Coturnice *Alectoris graeca*
Starna *Perdix perdix*
Quaglia *Coturnix coturnix*
Fagiano comune *Phasianus colchicus*

Pelecaniformes
Ciconiidae
Cicogna nera *Ciconia nigra*

Ardeidae
Airone cenerino *Ardea cinerea*

Suliformes
Phalacrocoracidae
Cormorano *Phalacrocorax carbo*

Accipitriformes
Accipitridae
Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*
Grifone *Gyps fulvus*
Biancone *Circaetus gallicus*
Aquila reale *Aquila chrysaetos*
Sparviere *Accipiter nisus*
Astore *Accipiter gentilis*
Falco di palude *Circus aeruginosus*
Albanella reale *Circus cyaneus*
Albanella pallida *Circus macrourus*
Albanella minore *Circus pygargus*
Nibbio reale *Milvus milvus*
Nibbio bruno *Milvus migrans*
Poiana calzata *Buteo lagopus*
Poiana *Buteo buteo*

Gruiformes
Rallidae
Porciglione *Rallus aquaticus*
Re di quaglie *Crex crex*
Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*

Gruidae
Gru *Grus grus*

Charadriiformes
Charadriidae
Corriere piccolo *Charadrius dubius*
Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

Scolopacidae
Frullino *Lymnocryptes minimus*
Piro piro culbianco *Tringa ochropus*
Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

Laridae
Gabbiano reale *Larus michahellis*

Columbiformes
Columbidae
Piccione di città *Columba livia* f. domestica
Colombaccio *Columba palumbus*
Tortora selvatica *Streptopelia turtur*

Cuculiformes
Cuculidae
Cuculo *Cuculus canorus*

Strigiformes
Strigidae
Assiolo *Otus scops*
Gufo reale *Bubo bubo*
Allocco *Strix aluco*
Civetta *Athene noctua*
Civetta capogrosso *Aegolius funereus*
Gufo comune *Asio otus*
Gufo di palude *Asio flammeus*

Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

Apodiformes
Apodidae
Rondone maggiore *Tachymarptis melba*
Rondone comune *Apus apus*
Rondone pallido *Apus pallidus*

Coraciiformes
Meropidae
Gruccione *Merops apiaster*

Bucerotiformes
Upupidae
Upupa *Upupa epops*

Piciformes
Picidae
Torcicollo *Jynx torquilla*
Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*
Picchio nero *Dryocopus martius*
Picchio verde *Picus viridis*
Picchio cenerino *Picus canus*

Picchio verde - *Gianmaria Zago*

Falconiformes
Falconidae
Grillaio *Falco naumanni*
Gheppio *Falco tinnunculus*
Smeriglio *Falco columbarius*
Falco cuculo *Falco vespertinus*
Lodolaio *Falco subbuteo*
Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Passeriformes
Laniidae
Averla piccola *Lanius collurio*
Averla maggiore *Lanius excubitor*
Averla capirossa *Lanius senator*

Corvidae
Ghiandaia *Garrulus glandarius*
Gazza *Pica pica*
Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*
Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*
Cornacchia nera *Corvus corone*
Cornacchia grigia *Corvus cornix*
Corvo imperiale *Corvus corax*

Paridae
Cincia mora *Periparus ater*
Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus*
Cincia bigia *Poecile palustris*
Cincia alpestre *Poecile montanus*
Cinciarella *Cyanistes caeruleus*
Cinciallegra *Parus major*

Alaudidae
Tottavilla *Lullula arborea*
Allodola *Alauda arvensis*

Hirundinidae
Rondine *Hirundo rustica*
Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*
Balestruccio *Delichon urbicum*

Aegithalidae
Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

Phylloscopidae
Luì grosso *Phylloscopus trochilus*
Luì piccolo *Phylloscopus collybita*
Luì bianco *Phylloscopus bonelli*
Luì verde *Phylloscopus sibilatrix*

Sylviidae
Capinera *Sylvia atricapilla*
Beccafico *Sylvia borin*
Bigiarella *Sylvia curruca*
Sterpazzola *Sylvia communis*
Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

Regulidae
Fiorrancino *Regulus ignicapilla*
Regolo *Regulus regulus*

Troglodytidae
Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

Sittidae
Picchio muratore *Sitta europaea*

Tichodromidae
Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

Certhiidae
Rampichino alpestre *Certhia familiaris*
Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

Sturnidae
Storno *Sturnus vulgaris*

Turdidae
Merlo dal collare *Turdus torquatus*
Merlo *Turdus merula*
Cesena *Turdus pilaris*
Tordo sassello *Turdus iliacus*
Tordo bottaccio *Turdus philomelos*
Tordela *Turdus viscivorus*

Muscicapidae
Pigliamosche *Muscicapa striata*
Pettirosso *Erithacus rubecula*
Usignolo *Luscinia megarhynchos*
Balia nera *Ficedula hypoleuca*
Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*
Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*
Codirossone *Monticola saxatilis*
Stiaccino *Saxicola rubetra*
Saltimpalo *Saxicola rubicola*
Culbianco *Oenanthe oenanthe*
Monachella *Oenanthe hispanica*

Cinclidae
Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Passeridae
Passera d'Italia *Passer italiae*
Passera mattugia *Passer montanus*
Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

Prunellidae
Sordone *Prunella collaris*
Passera scopaiola *Prunella modularis*

Motacillidae
Cutrettola *Motacilla flava*
Cutrettola testagialla orientale *Motacilla citreola*
Ballerina gialla *Motacilla cinerea*
Ballerina bianca *Motacilla alba*
Calandro *Anthus campestris*
Pispola *Antus pratensis*
Prispolone *Anthus trivialis*
Spioncello *Anthus spinoletta*



Fringillidae
Fringuello *Fringilla coelebs*
Peppola *Fringilla montifringilla*
Frosone *Coccothraustes coccothraustes*
Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*
Verdone *Chloris chloris*
Fanello *Linaria cannabina*
Crociere *Loxia curvirostra*
Cardellino *Carduelis carduelis*
Verzellino *Serinus serinus*
Lucherino *Spinus spinus*

Emberizidae
Strillozzo *Emberiza calandra*
Zigolo giallo *Emberiza citrinella*
Zigolo muciatto *Emberiza cia*
Zigolo nero *Emberiza cirlus*

Calcaridae
Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

Merlo acquaiolo in Val Fraselle - ***Mario Zara***

Bibliografia

• Brichetti P., Fracasso G., 2003: Ornitologia italiana. Vol. 1 *Gaviidae - Falconidae*. *Alberto Perdisa Ed.*: pp. 464.
• Brichetti P., Fracasso G., 2004: Ornitologia italiana. Vol. 2 *Tetraonidae - Scopolacidae*. *Alberto Perdisa Ed.*: pp. 398.
• Brichetti P., Fracasso G., 2015: Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. *Riv. ital. Orn.*, 85: 31-50.
• De Franceschi P., 1991. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. *Mem. Mus. civ. St. Nat. Verona*, 9: pp. 154.
• Parricelli P., 2007: Picchio cenerino (*Picus canus*) nel Parco Naturale Regionale della Lessinia. *La Lessinia - ieri oggi domani*, 30: 196-198.
• Gill F. & Donsker D., 2017: IOC World Bird List (v 7.3). *www.worldbirdnames.org*.
• Sighele M., Lerco R., 2015: Presenza invernale dello zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis* nel Parco della Lessinia (Verona, Veneto): relazione con l'innevamento al suolo. *Atti del XVII Convegno Italiano di Ornitologia, Trento*: 151-152.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2007: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2006. *Parco Naturale Regionale della Lessinia* e *Verona Birdwatching*: pp. 24.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2008: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2007. *Parco Naturale Regionale della Lessinia* e *Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2009: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2008. *Parco Naturale Regionale della Lessinia* e *Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2010: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2009. *Parco Naturale Regionale della Lessinia* e *Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2011: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2010. *Parco Naturale Regionale della Lessinia* e *Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2012: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2011. *Parco Naturale Regionale della Lessinia* e *Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2013: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2012. *Parco Naturale Regionale della Lessinia* e *Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2014: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2013. *Parco Naturale Regionale della Lessinia* e *Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2017a: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2014. *Parco Naturale Regionale della Lessinia* e *Verona Birdwatching*: pp. 32.
• Sighele M., Parricelli P. (red.), 2017b: Resoconto ornitologico del Parco della Lessinia. Anno 2015. *Verona Birdwatching* e *Parco Naturale Regionale della Lessinia*: pp. 40.
• Sighele M., Tormen G., 2016: Osservazioni di avvoltoi in Veneto nel 2016. *InfoGipeto*, 33: 30.

Sulle ali del tempo: artigli d'aquila e ali d'avvoltoio

rapaci preistorici e moderni in Lessinia

Da ***Grotta di Fumane*** è partita una ricerca, ripresa a livello europeo, sugli uccelli cacciati già dai Neandertal in Lessinia, persino 130.000 anni fa. Il 21 maggio 2016 si è tenuto un incontro proprio nei pressi della grotta, alla scoperta del rapporto dell'Uomo con il mondo alato, presenti l'archeozoologo Matteo Romandini dell'Università di Ferrara, Maurizio Sighele e Corrado Zanini dell'associazione Verona Birdwatching e Osvaldo Negra del MuSe. I temi della conferenza:
Quali specie volavano nei nostri cieli?
Quali le specie presenti oggi in Lessinia?
Perché artigli e ali dei rapaci erano così ambite dai nostri antenati preistorici?
Quali radici profonde nella fascinazione dell'Uomo per gli uccelli?

Tortolino Day

Il 5 settembre 2016 eravamo presenti in tanti, soci di Verona BW o Venezia BW, tutti in Lessinia per il ***Tortolino Day***, un'iniziativa che faceva parte del ***World Shorebirds Day***, un evento promosso per contare i limicoli in tutto il mondo.

Appena arrivati ci ha salutati un **biancone** sulla cima di un albero. La passeggiata sui prati sfalciati sui dolci profili della Lessinia ci ha fatto incontrare quasi subito un **piviere tortolino**. Ci siamo seduti e lui ha gradito la nostra presenza, avvicinandosi e passando tra di noi.

Sopra il gruppo sono passati più volte il **biancone** e il corvo imperiale (che faceva acquattare il tortolino). Abbiamo visto qualche fanello, prispolone, allodola, gheppio. In una pozza rana temporaria, tritone alpestre e giovani rospi comuni; tra le libellule *Anax imperator* e tra le farfalle molte *Erebiae*. A San Giorgio era ancora presente un maschio di **codirossone** (oltre a stiaccino, lodolaio, …).

Parco Naturale Regionale della Lessinia
Piazza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
www.lessinia.verona.it - parcocultura@lessinia.verona.it
tel.: 045 6799211 - fax: 045 6780677

Associazione Verona Birdwatching
www.veronabirdwatching.org - info@veronabirdwatching.org